

8. 花白色或红色，单瓣，长1—1.5厘米，雄蕊及雌蕊发育正常。
9. 苞被片6—7片，花柄上有苞被脱落留下2—3个环节。
10. 叶狭椭圆形，先端略尖，花白色 26. 短柱茶 *C. brevistyla* (Hayata) Coh. St.
10. 叶广椭圆形，长4.5—6.5厘米，先端锐尖，花红色
..... 27. 冬红短柱茶 *C. hiemalis* Nakai
9. 苞被片10片，花柄上有5—6苞被环痕，叶阔椭圆形或近圆形，先端钝
..... 28. 钝叶短柱茶 *C. obtusifolia* Chang
8. 花重瓣，红色，雄蕊及雌蕊异常 29. 樱花短柱茶 *C. maliflora* Lindl.
7. 嫩枝无毛，花瓣长1—2.5厘米。
11. 花白，叶稍发亮或暗晦，花直径2—3厘米。
12. 花瓣长1.5—2厘米，叶脉下陷，苞及萼7—8片，花瓣5—7片，近离生，锯齿尖锐
..... 30. 陕西柱短茶 *C. shensiensis* Chang
11. 花红色，叶面极光亮。
13. 叶长3—4厘米，花瓣5—6片 31. 粉红短柱茶 *C. puniceiflora* Chang
13. 叶长4.5—6.5厘米，花瓣多于7片 27. 冬红短柱茶 *C. hiemalis* Nakai
6. 叶倒卵形或卵形。
13. 叶卵形，先端尖，长达4.5厘米，苞及萼9片，花瓣6片，锯齿疏
..... 32. 大姚短柱茶 *C. tenii* Sealy
13. 叶倒卵形，先端圆或钝，长1.5—2.5厘米，苞及萼6—7片，花瓣5—7片，锯齿密
..... 33. 细叶短柱茶 *C. microphylla* (Merr.) Chien
5. 叶长圆形或倒披针形，长为宽的3—4倍。
14. 花小，直径2—3厘米。
15. 苞及萼9—10片，叶先端尖。
16. 花瓣5片，叶先端尖锐，下面有毛 34. 褐枝短柱茶 *C. phaeoclada* Chang
16. 花瓣7片，叶先端尖，下面无毛 24. 落瓣短柱茶 *C. kissi* Wall.
15. 苞及萼7片，叶先端钝 26. 短柱茶 *C. brevistyla* Coh. St.
14. 花大，直径5—6厘米，萼片及花瓣有毛，叶先端急尖，薄革质
..... 24b. 大花短柱茶 *C. kissi* var. *megalantha* Chang

22. 长瓣短柱茶 闽鄂山茶（中国高等植物图鉴）

Camellia grijsii Hance in Journ. Bot. 17: 9. 1879; Chang Tax. Gen. Camellia 34. 1981. — *C. yuhhsienensis* Hu in Acta Phytotax. Sin. 10: 139. 1965; — *C. odorata* Xie et Zhang in Acta Bot. Yunnan 9 (1): 57. 1987. syn. nov.

灌木或小乔木，嫩枝较纤细，有短柔毛。叶革质，长圆形，长6—9厘米，宽2.5—3.7厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部阔楔形或略圆，上面干后橄榄绿色，有光泽，无毛，或中脉基部有短毛，下面同色，中脉有稀疏长毛，侧脉6—7对，在上面略陷下，在下面突起，边缘有尖锐锯齿，齿刻相隔1.5—2毫米，叶柄长5—8毫米，有柔毛。花顶生，白

色，直径4—5厘米，花梗极短；苞被片9—10片，半圆形至近圆形，最外侧的长2—3毫米，最内侧的长8毫米，革质，无毛，花开后脱落；花瓣5—6片，倒卵形，长2—2.5厘米，宽1.2—2厘米，先端凹入，基部与雄蕊连生约2—5毫米；雄蕊长7—8毫米，基部连合或部分离生，无毛，花药基部着生；子房有黄色长粗毛；花柱长3—4毫米，无毛，先端3浅裂。蒴果球形，直径2—2.5厘米，1—3室，果皮厚1毫米。花期1—3月。

产福建、四川巫溪、江西黎川、湖北及广西北部。模式标本采自福建，缺具体地点。

本种过去只见于福建及湖北，最近见到桂北的标本（龙胜，钟济新91074），和原种记载基本一致，只是嫩枝的毛稍密，花丝连合不过半，花柱仅在先端3浅裂。

23. 小果短柱茶（中山大学学报）

Camellia confusa Craib in Kew Bull. 5. 1914; Coh. St. in Meded. Proefst. Thee 20. 71: 130. 1916; Chang Tax. Gen. Camellia 34. 1981. — *Thea drupifera* Craib in Kew Bull. 15. 1911. non Lour. — *Camellia oleifera* var. *confusa* (Craib) Sealy Rev. Gen. Camellia 209. 1958.

灌木，高2米，嫩枝有毛。叶革质，椭圆形，长7—10厘米，宽3.5—5厘米，先端渐尖或急锐尖，基部钝或近于圆形，上面浅绿色，暗晦，下面无毛，侧脉6—8对，边缘有细锯齿，叶柄长5—7毫米。花腋生，无柄，白色，苞被片10片，长8—14毫米，略有毛，干膜质；花瓣5片，长2—3厘米，无毛；雄蕊1—2列，长约8—9毫米，离生；子房有毛，花柱3条，离生，长5—6毫米。蒴果卵形，长1.5厘米，1室，有种子1粒，3片裂开，果爿厚2—3毫米。

产云南南部及西南部、广西南部、贵州西北部；分布于老挝、缅甸、泰国、越南。模式标本采自泰国澄迈，海拔1200—1650米常绿林中。

24. 落瓣短柱茶 落瓣油茶（中国高等植物图鉴） 图版5: 3—4

Camellia kissi Wall. in Asiat. Res. 8: 429. 1820; Sealy l. c. 197; Chang l. c. 35. — *Thea sasanqua* var. *kissi* (Wall.) Pierre Fl. Forest. Cochinch. 2: sub. t. 115—6. 1887; *Thea iniquicarpa* (Clarke MS) Kochs in Engler Bot. Jahrb. 27: 594. 1900. — *Thea bachamaensis* Gagnep. in Not. Syst. 10: 124. 1942. — *Thea brachystemon* Gagnep. l. c. 10: 124. 1942.

24a. 落瓣短柱茶（原变种）

Camellia kissi Wall. var. *kissi*

灌木至小乔木，嫩枝有柔毛。叶革质，长圆形或椭圆形，长5—7厘米，宽1.5—3厘米，先端渐尖或长尾状，基部楔形或略钝，上面干后深绿色，略有光泽，无毛，下面浅绿色，无毛，侧脉约7对，与网脉在上面陷下，在下面略突起，边缘密生锐利细锯齿，齿刻相隔1.5—2毫米，叶柄长4—6毫米，略有短毛。花白色，顶生或腋生，几无柄；苞被片9—10片，阔卵形，长2—7毫米，背面有稀疏绢毛，花开后脱落；花瓣7片，倒卵