

(Seem.) Pierre Fl. For. Cochinch. 2: t. 117. 1887.

乔木，高10米，嫩枝红褐色，无毛。叶长圆形，长7—12.5厘米，宽2—4厘米，先端尖锐，而有钝的尖头，基部楔形，上面深绿色，干后有光泽，无毛，下面干后带褐色，无毛，侧脉约9对，在上面隐约可见，在下面略起，边缘有疏钝齿，齿刻相隔3—5毫米，有时下半部近全缘，叶柄长约1厘米，无毛。花顶生，无柄，红色；苞片及萼片11—12片，组成高约2.5—3厘米的杯状苞被，在结果时半宿存，由下向上逐渐增大，半圆形至圆形，长4—20毫米，外面有绢毛；花瓣6—7片，基部与花丝连生约1厘米，各瓣之间微相连，或近离生，倒卵形至长倒卵形，长3.5—4厘米，宽1.5—2.3厘米，无毛或最外2片的背部中央有绢毛；雄蕊长3厘米，多轮，外轮花丝连生，包括与花瓣连生在内长约1.5厘米，游离花丝无毛，内侧2—3轮雄蕊完全离生；子房被密毛，花柱3条，离生，长3.5厘米，下半部有毛。蒴果圆球形，褐色，直径2—3厘米，3—4室，每室有种子1—2粒。3—4片裂开，果爿厚3—4毫米；种子半圆形或圆形，宽约1.3厘米。中轴三棱形，长约2厘米。花期12月至翌年2月。

模式标本采自香港快活谷。分布到广东阳江海陵岛。

本种的花被片半宿存，花瓣开放时不完全张开，花柱3条离生，是红山茶组罕见的现象。

### 81. 隐脉红山茶 图版24: 3—6


*Camellia cryptoneura* Chang Tax. Gen. *Camellia* 75. 1981; Chang et Bartholomew *Camelliolas*, 97, 1984.

乔木，高8米，嫩枝无毛，芽体有鳞片约15片，有短毛。叶革质，长圆状倒披针形，或长圆形，长9—12厘米，宽3—4厘米，先端渐尖，基部楔形，下延，上面干后橄榄绿色，发亮，嫩叶则暗晦，无毛，下面浅褐色，无毛，侧脉约6对，以35°开角急直向上，在上面能见，在下面不明显，边缘上半部有锯齿，齿刻相隔约2毫米，叶柄长1.5—2厘米，无毛。花1—2朵生枝顶，粉红色，无柄，花蕾椭圆卵形，长2.2厘米，宽1.3厘米；苞片及萼片8片，最下3片半圆形，长3—6毫米，背面有毛，内侧5片近圆形，长1.7厘米，两面有毛；花瓣8片，最外侧2—3片背面有毛，内侧5—6片倒卵形，基部连生，背面无毛；雄蕊约4轮，外轮雄蕊与花瓣基部连生，内轮雄蕊分离，无毛；子房有毛，花柱基部有毛，先端3浅裂。蒴果球形，直径4厘米，被灰褐色毛，3室，果爿厚4毫米，种子1—2个。花期12月至翌年1月。

模式标本采自广西龙胜，同时分布于大苗山、元宝山和湘南通道。

本种的叶片具有狭小开角而急行上升的6条侧脉，是很特殊的，花蕾未开放，有苞片及萼片8片，两面均有毛，花瓣8片，粉红色，雄蕊未伸长，不见花丝管，无毛，子房有毛，花柱3裂，无疑是属于山茶组的种类。

### 82. 卵果红山茶（中山大学学报）



图版 24 1—2. 浙江红山茶 *Camellia chekiangoleosa* Hu; 1. 花枝, 2. 蕊果。3—6. 隐脉红山茶 *Camellia cryptoneura* Chang; 3. 花枝, 4. 雄蕊, 5. 花柱, 6. 果。(谢庆建仿黄锦添)