

Camellia oviformis Chang l. c. 75. 1981. — *C. microdonta* Chang in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **29** (2): 91. 1990. syn. nov.

乔木，高8米，树皮褐色，嫩枝无毛。叶革质，长圆形，长11—16厘米，宽4—5.3厘米，先端急尖，基部阔楔形，上面干后深绿色，稍发亮，下面浅绿色，无毛；侧脉7—8对，在上面凹下，边缘有锐利锯齿，齿刻相隔1.5—2.5毫米，齿尖长1毫米，叶柄长约1厘米，无毛。花顶生，红色，无柄；苞片及萼片10片，外侧有绢毛，最下3片半月形，长2—6毫米，宽4—11毫米，内侧7片圆形至卵圆形，长8—14毫米；花瓣8片，倒卵形，背面有绢毛，连部连生；雄蕊多轮，外轮花丝下半部连合成短管，无毛，上半部游离花丝无毛；子房有毛，花柱先端3浅裂。蒴果卵形，长9厘米，宽7.5厘米，基部圆，先端稍窄而钝，褐色，3室，每室有种子1—2个，3片裂开，果片厚1—1.5厘米，木栓质；种子长2.5—3.5厘米。花期12月。

模式标本采自广西荔浦县栗木的苏家队，亦见于乐业山地。

本种容易与多齿红山茶 *C. polyodonta* How 及石果红山茶 *C. lapidea* Wu 混淆，但后二者的花丝管有毛，蒴果近木质；*C. microdonta* Chang 的花瓣虽为5片，但叶形及栓质的果皮与本种一致。

83. 短蕊红山茶 (中山大学学报)

Camellia brachygyna Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **28** (3): 51. 1989.

灌木，高2—3米，嫩枝无毛，顶芽有茸毛。叶革质，长圆形或长圆状披针形，长10—14厘米，宽3—5厘米，先端长尾状，尾部长1.5—3厘米，基部楔形；上面干后深绿色，发亮，下面黄绿色，有疏长毛，后变秃净；侧脉8—10对，在上面略陷下，网脉不明显，边缘有锐利锯齿，叶柄长1—1.2厘米。花红色，单独生于枝顶叶腋，近无柄；苞片及萼片8片，薄革质，外侧3—4片无毛，内侧4—5片多少被毛，长1.8厘米；花瓣7—8片，长3—3.5厘米，基部连生3—5毫米，无毛；雄蕊长2—2.5厘米，花丝管长1—1.3厘米，有稀疏柔毛，游离花丝无毛；子房3室，被茸毛；花柱长1—1.5厘米，顶端3裂。蒴果球形，宽4—6厘米，3片裂形，果片木栓质，厚1—1.3厘米。

模式标本采自四川盐边县，海拔2100米的常绿疏林中。

本种具有长尾状的长圆形叶片，花丝较长，花柱较短。

84. 粗毛红山茶 图版21: 2—3

Camellia setiperculata Chang Tax. Gen. Camellia 77. 1981.

灌木或小乔木，嫩枝无毛。叶革质，长圆形，长9—12厘米，宽2.8—4厘米，先端锐尖，基部楔形，上面深绿色，发亮，下面黄绿色，有光泽，侧脉6—8对，在两面能见，边缘除基部1/4之外，密生细锯齿，叶柄长1—1.5厘米。花淡红色，顶生，无柄；苞及萼8—9片，革质，内侧的长2.5厘米，被黄褐色粗毛；花瓣长4—5厘米，外侧被黄褐色粗毛，6—7片，基部连生；雄蕊长3厘米，外轮花丝基部连生，无毛；子房被黄褐色