

质，倒卵形，最大的长 1.7 厘米，外侧被灰黄色贴丝毛；花瓣 5—6 片，倒卵状心形，长 3—4 厘米，外侧 2—3 片较短小，有稀疏短柔毛，基部连生成 7—9 毫米长的花丝管；雄蕊 2.5—3 厘米，花丝管长 8 毫米，与游离花丝均无毛；子房 3—4 室，被茸毛，花柱长 2 厘米，先端 3 裂。蒴果球形，宽 4 厘米，3—4 片裂开，果片厚 5—7 毫米，木质；种子每室 2—3 个，褐色，无毛。

模式标本采自四川米易县，海拔 2 500 米的普威林场后山的疏林中，同时亦见于西昌县的螺髻山及盐边县的山地灌丛。

本种和白丝毛红山茶 *C. albo-sericea* Chang 较接近，但本种的叶片披针形，侧脉较少，在两面均不明显，蒴果较小，果皮木质。

92. 单体红山茶

Camellia uraku (Mak.) Kitamura in Acta Phytotax. et Geobot. Kyota 14: 63. 1951, 115. 1952; Chang Tax. Gen. Camelliu 71. 1981. — *Thea reticulata* var. *rosea* Mak. in Bot. Mag. Tokyo 24: 78. fig. 3. 1910; *Camellia reticulata* var. *rosea* Mak. in Journ. Jap. Bot. 1: 39. 1918.

小乔木，嫩枝无毛。叶革质，椭圆形或长圆形，长 6—9 厘米，宽 3—4 厘米，先端短急尖，基部楔形，有时近于圆形，上面发亮，无毛，侧脉约 7 对，边缘有略钝的细锯齿，叶柄长 7—8 毫米。花粉红色或白色，顶生，无柄，花瓣 7 片，花直径 4—6 厘米；苞片及萼片 8—9 片，阔倒卵圆形，长 4—15 毫米，有微毛；雄蕊 3—4 轮，长 1.5—2 厘米，外轮花丝连成短管，无毛；子房有毛，3 室，花柱长 2 厘米，先端 3 浅裂。

原产日本，多栽培供观赏，我国有栽培。

93. 五瓣红山茶

Camellia pentapetala Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni 28 (3): 54. 1989.

灌木，嫩枝有长毛，老枝秃净。叶革质，长圆形，长 7—11 厘米，宽 2.5—3.5 厘米，先端钝，基部阔楔形或略圆，上面干后黑绿色，不发亮，下面褐绿色，初时有长毛，以后变秃，侧脉 6—7 对，在上下两面与网脉均不明显，边缘有细浅齿，叶柄长 6—8 毫米。花红色，直径 4 厘米，单生于枝顶叶腋，近无柄；苞片及萼片 8—9 片，近秃净，最长 1—1.2 厘米，花瓣 5 片，倒卵形，长 2—2.5 厘米，无毛；雄蕊长 1.3 厘米，花丝管长 6 毫米，游离花丝长 6—7 毫米，均无毛；子房 3 室，被茸毛，花柱长 1 厘米，先端 3 裂。蒴果圆球形，直径 2—2.5 厘米，3 片裂开，果片厚 7—8 毫米。花期 12 月至翌年 1 月。

模式标本采自四川盐边县，为海拔 2 100 米的山地灌丛的常见种。

本种近似怒江红山茶 *C. saluenensis* Stapf，但叶片及花朵均较大，果皮较厚；与白丝毛红山茶 *Camellia albo-sericea* Chang 比较，则花朵较小，萼片外面无毛，花瓣较少，无毛，而易于区别。

94. 尖萼红山茶 图版 22: 1