

101. 闪光红山茶 图版 23: 1

Camellia lucidissima Chang Tax. Gen. *Camellia* 79. 1981; Chang et Bartholomew *Camelliolas*, 104, 1984.

小乔木，嫩枝无毛。叶革质，椭圆形，长7—13厘米，宽3—5厘米；先端急锐尖，基部阔楔形，上面干后深绿色，极光亮，下面绿色，略有光泽，无毛，侧脉6—7对，在上面能见，在下面略突起，网状小脉在上下两面均不很明显；边缘上半部有细锯齿；叶柄长1—1.5厘米。花红色，直径7—9厘米，生枝顶叶腋，近无柄；苞片及萼片9—10片，最外侧4片短小，长5—7毫米，近无毛，内侧5—6片卵圆形，长2—2.5厘米，革质，被贴生茸毛；花瓣6—7片，长5—6.5厘米，基部连生成为长约1厘米的花冠管；雄蕊长2.5—3厘米，外轮花丝离生，无花丝管，无毛；子房3室，无毛，花柱长2—2.5厘米，先端3浅裂。蒴果近球形，直径4厘米，3片裂开，果爿光滑，木质。花期冬季。

产浙江、江西。模式标本采自江西南丰军峰山，海拔900—1200米山地。

本种和离蕊红山茶 *C. liberistamina* Chang 近似，但叶脉明显，萼片无毛，花冠管较长，叶片于后叶面特别光亮，可资区别。

102. 浙江红山茶 浙江红花油茶（植物分类学报） 图版 24: 1—2

Camellia chekiangoleosa Hu in *Acta Phytotax. Sin.* 10: 131. 1965; Chang Tax. Gen. *Camellia*, 79, 1981.


小乔木，高6米，嫩枝无毛。叶革质，椭圆形或倒卵状椭圆形，长8—12厘米，宽2.5—5.5厘米，先端短尖或急尖，基部楔形或近于圆形，上面深绿色，发亮，下面浅绿色，无毛；侧脉约8对，在上面明显，在下面不明显；边缘3/4有锯齿；叶柄长1—1.5厘米，无毛。花红色，顶生或腋生单花，直径8—12厘米，无柄；苞片及萼片14—16片，宿存，近圆形，长6—23毫米，外侧有银白色绢毛；花瓣7片，最外2片倒卵形，长3—4厘米，宽2.5—3.5厘米，外侧靠先端有白绢毛，内侧5片阔倒卵形，长5—7厘米，宽4—5厘米，先端2裂，无毛；雄蕊排成3轮，外轮花丝基部连生约7毫米，并和花瓣合生，内轮花丝离生，长3—3.5厘米，有稀疏长毛，花药黄色；子房无毛，花柱长2厘米，先端3—5裂，无毛。蒴果卵球形，果宽5—7厘米，先端有短喙，下面有宿存萼片及苞片，果爿3—5片，木质，厚1厘米，中轴3—5棱，长3厘米；种子每室3—8粒，长2厘米。花期4月。

产福建、江西、湖南、浙江。模式标本采自浙江开化，海拔500—1100米的山地。

在具有红色、大花的山茶组里，本种除花朵较大外，苞片及萼片14—16片，子房3—5室，蒴果有不完全宿存的萼片及苞片。它和山茶 *C. japonica* 很接近，但后者的苞片及萼片只有9—10片。

103. 莽山红山茶

Camellia mongshanica Chang et Ye in *Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni* 29 (2): 91.



图版 24 1—2. 浙江红山茶 *Camellia chekiangoleosa* Hu; 1. 花枝, 2. 蕊果。3—6. 隐脉红山茶 *Camellia cryptoneura* Chang; 3. 花枝, 4. 雄蕊, 5. 花柱, 6. 果。(谢庆建仿黄锦添)