

灌木，高1.5—3米，嫩枝有披散柔毛。叶革质，卵形或椭圆形，长2—3厘米，宽1—1.6厘米，先端尖而有钝的尖头，基部阔楔形，上面深绿色，干后略有光泽，无毛，或中脉基部略有短毛，下面除中脉基部有毛外，秃净，侧脉约5对，在上面陷下，在下面不明显，边缘有疏锯齿，齿刻相隔2—3毫米，叶柄长1—1.5毫米，略有短毛。花顶生及腋生，花柄长2毫米；苞片4片，卵形，长1—1.5毫米，有睫毛；萼片5片，阔卵形，长2毫米，先端圆，有睫毛；花冠白色，长1厘米，无毛；花瓣5片，最外2片近圆形，长7—8毫米，基部略相连生，内侧3片与雄蕊相连生约2毫米，倒卵圆形，长1厘米；雄蕊长8—9毫米，除基部与花瓣连生外，其余部分分离，无毛；子房无毛，花柱长7—8毫米，无毛，先端3浅裂。蒴果梨形，长1厘米，宽7—8毫米，2—3室，种子1粒，果片厚约1毫米，果柄增厚，长5—6毫米，有宿存苞片。

产四川及湖北兴山。模式标本采自四川峨眉山。

本种的嫩枝有毛，叶片短小，卵形或椭圆形，花丝几全部分离，无毛；子房无毛，花柱3浅裂；蒴果梨形，果片略厚。它和川鄂连蕊茶 *C. rosthorniana* Hand.-Mazz. 较接近，后者叶片较长，花丝基部连合成短管，蒴果圆球形。

187. 微花连蕊茶 图版40: 3—4

Camellia minutiflora Chang Tax. Gen. *Camellia* 140. 1981; Chang et Bartholomew, *Camellias*, 168. 1984.

灌木，嫩枝有微毛，干时暗褐色。叶长圆形或披针形，长2—3.5厘米，宽6—9毫米，先端钝或略尖，基部楔形，上下两面无毛，边缘有锯齿，侧脉约6对，隐约可见，叶柄长1—2毫米。花白色，1—2朵腋生，细小，花柄长1—2毫米；苞片4—5片，长不及1毫米；萼片5，披针形，长1—1.5毫米，无毛；花瓣5—6片，倒卵形，长6—8毫米，宽4—6毫米，先端凹入，无毛；雄蕊长5—7毫米，无毛，近离生，或基部稍连合，花药基部着生；子房无毛，花柱长5—7毫米，先端3浅裂。蒴果未见。

模式标本采自香港八仙岭，海拔350—500米疏林中。

在离生雄蕊这个系里，本种具有最小的叶片和花朵。它可能和蒙自连蕊茶 *C. forrestii* Coh. St. 较接近，后者叶为椭圆形，花的各部分都较大，在外貌上看，本种接近 *C. euryoides* Lindl.，后者叶片较尖，雄蕊基部连生，花柄长达1厘米。

188. 细尖连蕊茶

Camellia parvicuspidata Chang Tax. Gen. *Camellia* 141. 1981; Chang et Bartholomew *Camellias*, 168. 1984.

灌木，嫩枝有短柔毛。叶革质，披针形，长4—6厘米，宽1—1.5厘米，先端尾状渐尖，尾长1—1.5厘米，基部楔形，上面干后灰褐色，不发亮，中脉有短柔毛，下面无毛，侧脉约6对，在上下两面均不明显，边缘有细锯齿，齿刻相隔1—3毫米，叶柄长1—2毫米，有短柔毛。花顶生，花柄长1—2毫米；苞片5片，卵形，先端尖，长1—2毫米，



图版 40 1—2. 黄杨叶连蕊茶 *Camellia buxifolia* Chang: 1. 花枝, 2. 萼及花柱。
3—4. 微花连蕊茶 *Camellia minutiflora* Chang: 3. 花枝, 4. 萼及花柱。(谢庆建绘)