

2. 叶薄革质, 倒卵形, 先端钝, 边缘大部分有锯齿, 花直径 5—8 厘米, 萼片圆形, 长 1 厘米, 苞片 6 片 2. **黄药大头茶** *G. chrysantra* Cowan
1. 叶长圆形或椭圆形, 先端尖锐。
3. 叶大, 长于 14 厘米, 宽于 5 厘米。
4. 叶椭圆形, 花柄极短, 花直径 7—9 厘米, 萼片长 1—1.5 厘米, 干膜质, 被褐毛, 蒴果长 3—3.5 厘米 3. **四川大头茶** *G. acuminata* Chang
4. 叶长圆形, 花柄长 6—8 毫米, 花直径 8 厘米, 萼片长 2 厘米, 革质, 被灰白毛, 果长 5 厘米 4. **长果大头茶** *G. longicarpa* Chang
3. 叶小, 短于 12 厘米, 宽 1.5—4.5 厘米。
5. 叶椭圆形, 厚革质, 侧脉密, 花直径 6 厘米 5. **广西大头茶** *G. kwangsiensis* Chang
5. 叶狭长圆形, 花直径 4 厘米 6. **海南大头茶** *G. hainanensis* Chang
1. **大头茶** (中国高等植物图鉴)

Gordonia axillaris (Roxb.) Dietr. Syn. Pl. 4: 863. 1847. — *Camellia axillaris* Roxb. ex Ker-Gawl. in Bot. Reg. t. 349. 1818; Sims Bot. Mag. t. 2047. 1819. — *Gordonia anomala* Spreng. Syst. 3: 126. 1826; — *Polyspora axillaris* Sweet Hort. Brit. 1: 61. 1826; Icon. Cormophyt. Sin. 2: 857. 1980.

1a. **大头茶** (原变种) (广东植物志) 图版 57: 4—6

var. **axillaris**

乔木, 高 9 米, 嫩枝粗大, 无毛或有微毛。叶厚革质, 倒披针形, 长 6—14 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端圆形或钝, 基部狭窄而下延, 侧脉在上下两面均不明显, 无毛, 全缘, 或近先端有少数齿刻, 叶柄长 1—1.5 厘米, 粗大, 无毛。花生于枝顶叶腋, 直径 7—10 厘米, 白色, 花柄极短; 苞片 4—5 片, 早落; 萼片卵圆形, 长 1—1.5 厘米, 背面有柔毛, 宿存; 花瓣 5 片, 最外 1 片较短, 外面有毛, 其余 4 片阔倒卵形或心形, 先端凹入, 长 3.5—5 厘米; 雄蕊长 1.5—2 厘米, 基部连生, 无毛; 子房 5 室, 被毛, 花柱长 2 厘米, 有绢毛。蒴果长 2.5—3.5 厘米; 5 片裂开, 种子长 1.5—2 厘米。 花期 10 月至 1 月。

产广东、海南、广西、台湾。模式标本采自香港。

本种在 Botanical Register 发表时, 据称产自马来西亚的庇宁, 现在看来不一定可靠, 很可能是从中国引去的。它的叶形很稳定, 倒披针形, 先端圆, 全缘。但从广东往西到达十万大山, 叶的先端变钝, 并出现齿刻。再往西及往北部扩展, 种群起了变化, 在四川及云南等地都出现特有种。

1b. **南头大头茶** (变种)

var. **nantoensis** Keng in Taiwania 1: 226. 1950.

与原变种的区别在于蒴果较长, 长达 4 厘米。

模式标本采自我国台湾南头。

另一变种 *G. axillaris* var. *tagawae* (Ohwi) Keng in Taiwania 1: 226. 1950, 不