

花萼与花瓣均为 5 数，萼片宿存，雄蕊多数，子房 5 室，蒴果无中轴，种子具翅或缺。

本族有 2 属，均产中国，紫茎属 *Stewartia* 同时分布于日本及北美。

6. 折柄茶属 *Hartia* Dunn

Dunn in Hook. Ic. Pl. t. 2727, 1902; Chang in Fl. Guangdong
2: 151. 1991.

乔木或灌木，树皮灰褐色，芽体无鳞苞，藏在对折的叶柄内。叶常绿，互生，有锯齿。花单生，稀为总状花序，白色，有短柄；苞片 2，宿存；萼片 5，宿存；花瓣 5 片，基部连生；雄蕊多数，排成多列，外轮花丝下半部连合成短管，花药背部着生；子房 5 室，每室有胚珠 5—6 个，基底着生；花柱连合，先端 5 裂。蒴果卵状球形，先端尖，木质，室背裂开为 5 片，中轴短；种子每室 4—6 个，褐色，扁平，无翅或有窄翅，胚乳缺。

本属模式种：折柄茶 *H. sinensis* Dunn

本属有 15 种，除 1 种见于老挝外，其余产我国南部及西南部，其中 3 种到达中南半岛北部。

本属和紫茎属 *Stewartia* 非常接近，但是顶芽无鳞苞，直接藏在有翅而对折的叶柄内；叶常绿，并在每年春季开花前全部脱落，换发新叶；胚珠每室 4—6 个，蒴果有短的中轴；苞片较小，花后脱落；而紫茎属 *Stewartia* 则相反，芽有鳞苞，叶脱落或半脱落，叶柄无翅，胚珠 2 个，苞片大于萼片，宿存；蒴果的中轴不明显。紫茎属可能是从折柄茶属分化出来的。

分种检索表

1. 萼片圆形或倒卵形，革质，长与宽均 4—8 毫米。
 2. 叶近全缘，先端圆或钝，基部圆或微心形。
 3. 叶椭圆形，长 4—6 厘米，先端钝，花单生 1. 小叶折柄茶 *H. tonkinensis* Merr.
 3. 叶倒卵形，长 7—12 厘米，先端圆，基部微心形，蒴果排成总状
..... 2. 钝叶折柄茶 *H. obovata* Chun
 2. 叶边缘有锯齿，叶先端尖，基部微心形或狭而钝。
 4. 嫩枝秃净，叶厚革质，长卵形，基部微心形，叶柄长 1.5—2 厘米，果片宽 8 毫米，萼片长 6—8 毫米 3. 圆萼折柄茶 *H. crassifolia* Yan
 4. 嫩枝被毛，叶薄革质，长圆形或倒卵形，基部狭而钝，叶柄长 1—1.5 厘米，果片宽 4—6 毫米，萼片长 4—6 毫米。
 5. 花单生，苞片长 2—3 毫米。

6. 叶长圆形, 8—12×2—4 厘米, 果片长 1 厘米…………… 4. 小花折柄茶 *H. micrantha* Chun
6. 叶椭圆形或倒卵形, 8—14×3—6 厘米。
7. 蒴果长圆锥形, 先端尖, 有 5 条棱, 花柱长 3—4 毫米……………
- …………… 5. 云南折柄茶 *H. yunnanensis* Hu
7. 蒴果球形, 先端圆, 有 5 条直沟, 花柱长 1.5 毫米……………
- …………… 6. 四川折柄茶 *H. sichuanensis* Yan
5. 花 2—3 朵排成总状花序, 苞片长 5—7 毫米…………… 7. 总状折柄茶 *H. gracilis* Chang et Ye
1. 萼片长卵形, 长度大于宽度, 近膜质, 易碎。
8. 花单生。
9. 萼片先端圆形, 长 9—12 毫米。
10. 叶厚革质, 无毛, 基部近心形…………… 8. 心叶折柄茶 *H. cordifolia* Li
10. 叶革质, 下面被柔毛, 基部圆形。
11. 叶长约 10 厘米, 萼宿存, 长 7—8 毫米…………… 9. 短萼折柄茶 *H. brevicalyx* Chang
11. 叶长 15—17 厘米, 宿存萼长 7—12 毫米……………
- …………… 10. 南昆折柄茶 *H. nankwanica* Chang et Ye
9. 萼片先端尖, 长 12—20 毫米。
12. 萼片长 12—15 毫米, 蒴果长 20 毫米, 侧脉 10—12 对…………… 11. 折柄茶 *H. sinensis* Dunn
12. 萼片长 15—16 毫米, 蒴果与萼片等长, 侧脉 10—16 对。
13. 枝、叶的毛被松散。
14. 叶椭圆形, 长 8—13 厘米…………… 12a. 毛折柄茶 *H. villosa* Merr.
14. 叶椭圆形, 长 4—6 厘米…………… 12b. 短叶毛折柄茶 *H. villosa* var. *elliptica* Chang
13. 枝叶的毛被紧贴。
15. 叶片长 15—21 厘米…………… 12c. 大叶毛折柄茶 *H. villosa* var. *grandifolia* Chang
15. 叶片长 8—12 厘米…………… 12d. 贴毛折柄茶 *H. villosa* var. *kwangtungensis* Chang
8. 花 2—3 朵排成总状花序, 萼片被黄毛, 叶脉多少下陷。
16. 苞片及萼片卵形, 宽 8—10 毫米, 边缘有疏齿…………… 13. 黄毛折柄茶 *H. sinii* Wu
16. 苞片及萼片披针形, 宽 5—6 毫米, 叶近全缘…………… 14. 狭萼折柄茶 *H. densivillosa* Hu
1. 小叶折柄茶 (广东植物志)

Hartia tonkinensis Merr. in Journ. Arn. Arb. **19**: 54. 1938. — *Hartia multinervis* Yan in Acta Phytotax. sin. **19** (4): 470. 1981. — syn. nov.

乔木, 嫩枝及芽被灰色柔毛。叶革质, 椭圆形, 长 4—6 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端钝, 基部圆形, 上面秃净, 下面中肋有残留柔毛; 侧脉 10—12 对, 网脉在两面均能见; 全缘或有波状齿, 叶柄长 8—12 毫米, 有 1—1.5 毫米宽的狭翅, 幼时被毛; 花单生叶腋, 白色, 直径 2.5 厘米, 花柄长约 3 毫米; 苞片 2, 披针形, 长约 5 毫米, 宽约 2 毫米, 早落; 萼片 5, 近圆形, 长 4—6 毫米, 宽 4—6 毫米, 被毛, 覆瓦状排列, 基部连合; 花瓣长卵形或阔倒卵形, 边缘有齿状细裂; 雄蕊多数, 花丝长短不一, 基部略联合; 子房圆