

被毛，萼缘有腺毛状粗睫毛；雄蕊多数；子房圆锥状。蒴果圆锥形，果片长1厘米，种子长5—6毫米。花期5—6月。

模式标本采自广东大埔及饶平一带山区。

H. nitida Li 的叶片比本种的模式长得多，但花的形态，特别是萼的形态，二者完全一致。

5. 云南折柄茶 云南舟柄茶（中国高等植物图鉴） 图版 63：1—5

Hartia yunnanensis Hu in Bull. Fan Mem. Ist. Biol. **6**: 169. 1935.

乔木，高6—25米，枝灰褐色，幼时被贴生柔毛，后变秃净。叶革质，长圆形或椭圆状披针形，长8—12厘米或更长，宽3—6厘米，顶端急尖或短渐尖，基部圆形，边缘有小齿，幼时下面被疏柔毛；侧脉11—12对，叶柄长1—1.5厘米，被贴生柔毛。花单生于叶腋，花柄长3毫米；苞片2，披针形，长3—4毫米，宽2—3毫米，早落；萼片肾圆形，长5—6毫米，宽5—7毫米，外面被短柔毛，边缘有乳头状粗睫毛；花瓣白色，外面密被灰白色绢毛；雄蕊多数，花丝下半部连合；子房长圆锥形，被柔毛，花柱长3—4毫米。蒴果长圆锥形，直径1厘米，种子有翅，长6毫米，宽3—4毫米。花期5—6月。

模式标本采自云南屏边，分布到广西那坡山区。

本种的特点在于叶片基部狭窄，苞片披针形，较短小，蒴果长卵形。

6. 四川折柄茶 图版 64：1

Hartia sichuanensis Yan in Acta Phytotax. Sin. **19**: 469, 1981.

灌木或小乔木，高2米，嫩枝有短柔毛。叶薄革质，椭圆形或倒卵状椭圆形，长8—10厘米，宽3—4.5厘米，先端短尖或略钝，基部近圆形，上面暗晦，下面在结实时中脉上有毛，侧脉8—10对，边缘有细钝齿，叶柄长1—1.5厘米，多少被柔毛。果柄长5—7毫米；蒴果近球形，长9毫米，宽1厘米，顶端近圆形；果皮无毛，有5条直沟。宿存花柱长1.5毫米；萼片圆形，直径5—6毫米，被毛。花期4—5月。

模式标本采自四川屏山县。

本种和总状折柄茶 *H. gracilis* (Yan) Chang et Ye 无论在叶形或蒴果及萼片的形态方面都很近似，只是本种的毛被不呈灰白色，花及果实单生，不排成总状。它与云南折柄茶 *H. yunnanensis* Hu 的区别后者的蒴果呈长卵形。

7. 总状折柄茶

Hartia gracilis (Yan) Chang et Ye, stat. nov. — *H. yunnanensis* var. *gracilis* Yan in. Act. Phytotax. Sin. **19**: 470, 1981. — *H. racemosa* Chang et Ye in Act. Sci. Nat. Univ. Sunyatseui, **21** (4): 75. 1982. — Syn. nov.

小乔木，嫩枝有灰白色茸毛。叶长圆形至倒卵状长圆形，革质，长7—10厘米，宽2.5—4厘米，先端急尖，尖头钝而微凹入，基部楔形，上面干后略发亮，下面沿中脉有柔毛，其余部分无毛，侧脉9—12对，在上面不明显，在下面能见，边缘有细齿，叶柄



图版 64 1. 四川折柄茶 *Hartia sichuanensis* Yan. 2—7. 折柄茶 *Hartia sinensis* Dunn.

2. 花枝, 3. 雄蕊, 4. 花瓣, 5. 子房直切, 6. 种子, 7. 雌蕊。(蔡淑琴绘)