

长 11—13 厘米，具翅，翅宽 1.5 毫米，被灰白色茸毛。花腋生，2—4 朵排成总状，花序柄长 5—7 毫米；苞片 2，离生于萼片之下，披针形，长 5—7 毫米，被灰白色柔毛；萼片 5，圆形，宽 5 毫米，先端圆，边缘有睫毛，被灰白色柔毛；花瓣 5，宽倒卵形，长 1.5 厘米，被毛；雄蕊多数，花丝基部略连生；子房被毛；花柱长 2—4 毫米，先端微裂；胚珠每室 5—6 个。蒴果近球形，种子有狭翅。

模式标本采自云南大围山。

本种近似云南折柄茶 *H. yunnanensis* Hu，但后者花单生，花柄极短，苞片较短，蒴果长圆锥形。

8. 心叶折柄茶 图版 63: 11—13

Hartia cordifolia Li in Journ. Arn. Arb. **26**: 65. 1945. — *Hartia quizhouensis* Ye in Guihaia (4) 2: 136—137. 1984.

高大乔木，高 12—18 米，嫩枝被毛。叶厚革质，长卵形，长 5—8 厘米，宽 3—4.5 厘米，顶端短尖或长渐尖，基部心形或近圆形，上面干后深绿色，下面秃净，但嫩叶有贴生柔毛，侧脉 10—12 对，边缘有疏锯齿，叶柄长 1.2—2.5 厘米，具翅，翅宽 2—3 毫米，幼时被毛，后脱落。花单生于叶腋，花柄长 4—6 毫米，被毛；苞片 2，狭披针形，长 4—7 毫米，宽 2—3 毫米，被毛；萼片长卵形，长 9—12 毫米，宽 5—7 毫米，顶端圆形，外有柔毛。内面下半部有微毛；花瓣白色，长 1.2—1.5 厘米，宽约 8—10 毫米；雄蕊多数，长 8—10 毫米；子房圆锥形，无毛。蒴果木质，圆锥形，长 1 厘米，直径 1.4 厘米。种子多数，具翅。花期 6—7 月。果实秋后成熟。

模式标本采自广西大瑶山。分布到湖南莽山常绿林里。

本种和厚叶折柄茶 *H. crassifolia* Yan 近似，但后者的萼片近圆形，长不过 8 毫米，而本种的萼片长卵形，长 9—12 毫米。

9. 短萼折柄茶 (西藏植物志) 图版 65: 1—2

Hartia brevicalyx Chang in Acta Sci. Nat. Univ. Sunyatseni **22** (3): 65. 1983; Chang in Fl. Xizangica **3**: 261, 1986.

小乔木，嫩枝有柔毛。叶革质，长圆形，长 6—10 厘米，宽 2.5—4 厘米，先端尖或略钝，基部圆形，上面干后略发亮，下面有柔毛，中脉有茸毛，侧脉约 10 对，在上面能见，在下面突起，边缘有细齿，叶柄长约 1 厘米，被灰褐色茸毛，柄翅宽 1.5 毫米。花未见。蒴果单生于叶腋，卵圆形，长 1.5 厘米，宽 1.3 厘米，被褐色柔毛；宿存萼片卵形，长 7—8 毫米，先端圆形或钝，外面被褐色茸毛；果柄长 5—8 毫米，被茸毛，后变秃净；种子扁平，椭圆形，长 5—7 毫米，每室 2—3 个。

模式标本采自西藏墨脱常绿林里。

本种近似折柄茶 *H. sinensis* Dunn，但叶下面有长毛，蒴果近球形，先端钝或略尖，宿存花柱较短，萼毛较短，先端近圆形。本种是在中国分布最西的种，它和四川折柄茶



图版 63 1—5. 云南折柄茶 *Hartia yunnanensis* Hu: 1. 花枝, 2. 花, 3. 雄蕊群, 4. 雄蕊, 5. 开裂蒴果。6—8. 钝叶折柄茶 *Hartia obovata* Chun ex Chang: 6. 枝条, 7. 开裂蒴果, 8. 果另。9—10. 小花折柄茶 *Hartia micrantha* Chun: 9. 枝条, 10. 开裂蒴果。11—13. 心叶折柄茶 *Hartia cordifolia* Li: 11. 花枝, 12. 雄蕊, 13. 开裂蒴果。(余峰绘)