

间深棕色鳞片，鳞片边缘流苏状，向上渐秃净；叶片矩圆披针形，长24—46厘米，宽12—14厘米，先端渐尖，基部不变狭，奇数一回羽状；侧生羽片18—22对，互生，近平伸，柄极短，矩圆披针形，中部的长6—7厘米，宽1.5—2.0厘米，先端渐尖，基部为偏斜近圆楔形、上侧近截形、下侧楔形或弧形，边缘全缘而常成波状；具羽状脉，小脉联结成1行网眼，腹面略下凹；背面不明显；顶生羽片狭卵形，长4—5厘米，宽约2.5厘米，下部羽状浅裂。叶为革质，腹面光亮，背面疏生毛状小鳞片；叶轴腹面有浅纵沟，有狭披针形及线形深棕色鳞片。孢子囊群位于主脉两侧各成2行；囊群盖圆形，盾状，边缘近全缘。

产贵州南部（荔波）。生林下，海拔740米。模式标本采自贵州荔波。

本种体型较大，叶不为明显的奇数羽状，即顶生羽片为羽裂状，有可能是杂交个体。


12. 披针贯众（植物分类学报） 无齿贯众（植物分类学报） 图版56: 3

Cyrtomium devexiscapulae (Koidz.) Ching in Bull. Chin. Bot. Soc. **2** (2): 96. 1936; Tard.-Blot et C. Chr. in Fl. Indo-Chine **7** (2): 377. 1941; Shing in Acta Phytotax. Sinica Addit. **I**: 14. 1965; Fl. Fukien **1**: 183. 1982; Shing in Fl. Jiangxi **1**: 292. f. 300.; C. F. Zhang, Fl. Zhejiang **1**: 212. 1993. — *Polystichum devexiscapulae* Koidz. in Acta Phytotax. Geobot. **1**: 33. 1932. — *Cyrtomium falcatum* var. *devexiscapulae* (Koidz.) Tagawa in Acta Phytotax. Geobot. **3** (2): 60. f. 1 (8). 1934; Ching, Ic. Fil. Sin. **3**: pl. 127. 1935; Nakaike, N. Fl. Jap. Pterid. 353. f. 353b. 1982. — *C. falcatum* Presl. p. p. Tagawa, Col. Ill. Jap. Pterid. 197. 1959; Nakaike, Enum. Pterid. Jap. 201. 1975; Kurata in Sci. Rep. Yokosuka City Meus. **8**: 45. 1963. — *Phanerophlebia falcata* var. *devexiscapulae* (Koidz.) Ohwi, Fl. Jap. Pterid. 69. 1957. — *Cyrtomium integrum* Ching et Shing ex Shing l. c. 12. 1965; C. F. Zhang, Fl. Zhejiang **1**: 212. 1993. — *C. sinicum* Ching ex Shing l. c. 30. 1965.

植株高40—80厘米。根茎直立，密被披针形棕色鳞片。叶簇生，叶柄长16—50厘米，基部直径3—5毫米，禾秆色，腹面有浅纵沟，密生卵形及披针形棕色有时中间带黑棕色鳞片，鳞片边缘流苏状，有时上部秃净；叶片卵状披针形，长34—55厘米，宽12—20厘米，先端渐尖，基部不变狭有时略宽，奇数一回羽状；侧生羽片7—10对，互生，斜向上；有短柄，披针形，有时成上弯的镰形，下部的长9—15厘米，宽2—3.5厘米，先端渐尖成尾状，基部为略偏斜的宽楔形，边缘全缘有时成波状，基部一对羽片有时较宽；具羽状脉，小脉联结成3—7行网眼，腹面不明显，背面微凸起；顶生羽片披针形，边缘波状，有时下部浅裂，长9—10厘米，宽2.5—3.5厘米。叶为革质，两面光滑；叶轴腹面有浅纵沟，有披针形及线形的棕色鳞片，常脱落。孢子囊群遍布羽片背面；囊群盖圆形，盾状，全缘。

产浙江（普陀）、江西（萍乡）、福建（南坪、连城）、广东、广西、四川（城口、屏山）、贵州（荔波、三合）。生林下，石灰岩上，海拔380—700米。日本、朝鲜半岛、越南北部也有分布。

13. 全缘贯众（中国主要植物图说·蕨类植物门）



图版 56 1—2. 厚叶贯众 *Cyrtomium pachyphyllum* (Rosenst.) C. Chr.: 1. 叶, 2. 囊群盖。3. 披针贯众 *Cyrtomium devexiscapulae* (Koidz.) Ching: 羽片。4—5. 斜基贯众 *Cyrtomium obliquum* Ching et Shing: 4. 羽片腹面, 5. 羽片背面。6. 新宁贯众 *Cyrtomium sinningense* Ching et Shing: 叶。(陈篪绘)