

面近无毛，内面有柔毛，边缘有睫毛，有明显3条脉；花瓣倒披针状线形，长4—45厘米，宽1—1.5毫米，先端略钝或急尖，外面近无毛，内面被柔毛，边缘具睫毛，有明显3条脉；花丝长约4毫米，花药圆形；花盘腺体近方形，有粗毛；子房向上收缩成分离花柱，无毛，花柱3，无毛，长于雄蕊；侧膜胎座3，每个胎座有胚珠4颗。花期8月至次年的5月。

产广东（阳春、阳江、台山）、广西（东兴）。生于低海拔疏林的林缘。模式标本采自广东阳春。

此种似即在 *Homalium cochinchinense* (Lour.) Bruce 的变异范围之内，不宜分立。（主编吴征镒注）

9. 天料木（广东）

Homalium cochinchinense (Lour.) Druce in Rept. Bot. Exch. Club. Brit. Isles **4**: 628. 1917; Merr. in Lingn. Sci. Journ. **14**: 40. 1936, et in Trans. Am. Philos. Soc. New. Ser. **24** (2): 272. 1938; Hand. -Mazz. in Beih. Bot. Centralbl. **48**: 306. 1931; et in Osterr. Bot. Zeitschr. **35**: 308. 1936; How et Ko in Acta Bot. Sin. **8** (1): 41. 1959; Li, Woody Fl. Taiwan 605. 1963; 海南植物志 **1**: 461. 1964; 中国高等植物图鉴 **2**: 921, 图 3572. 1972; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam **11**: 84. 1970; Li, in Fl. Taiwan **3**: 763. 1977; 台湾树木志 403. 1988; 台湾高等植物彩色图志 **3**: 520. 1988; 福建植物志 **4**: 17. 1989; G. S. Fan in Journ. Wuhan Bot. Res. **8** (2): 132. 1990; 广东植物志 **2**: 114. 1991; 广西植物志 **1**: 669. 1991. ——*Astranthus cochinchinensis* Lour. Fl. Cochinchin. 222. 1790. ——*Blackwellia fagifolia* Lindl. in Trans. Hort. Soc. Bot. London **6**: 269. 1826. ——*B. padiflora* Lindl. in Bot. Regist. t. 1308. 1830. ——*Homalium fagifolium* Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 312. 1904; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1008. 1921; Kanehira Form. Trees ed. 2, 476. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学(二版)860. 1953. ——*H. digynum* Gagnep. in Lecomte, Not. Syst. **3**: 247. 1914. et in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 1009. 1921, syn. nov.

9a. 天料木（原变种） 图版 6: 6

var. *cochinchinense*

小乔木或灌木，高2—10米；树皮灰褐色或紫褐色；小枝圆柱形，幼时密被带黄色短柔毛，逐渐脱落，老枝无毛，有明显纵棱。叶纸质，宽椭圆状长圆形至倒卵状长圆形，长6—15厘米，宽3—7厘米，先端急尖至短渐尖，基部楔形至宽楔形，边缘有疏钝齿，两面沿中脉和侧脉被短柔毛，偶在下面有疏短柔毛，中脉在上面凹，在下面凸起，侧脉7—9对，在边缘处网结；叶柄短，长2—3毫米，被带黄色短柔毛。花多数，单个或簇生排成总状，总状花序长（5—）8—15厘米，有时略有分枝，被黄色短柔毛；