

8. 刺篱木属 *Flacourtia* Comm. ex L'Hérit.

L'Hérit. Stirp. Nov. **3**: 59, t. 30, 3014. 1786; DC. Prodr. **1**: 256. 1824; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **1**: 128. 1862; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 191. 1872; Baill. Hist. Pl. **4**: 302. 1873; Warb. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. **3** (6a): 43. 1893; Gagnep. in Lecomte, Pl. Gen. Indo-Chine **1**: 233. 1909; Gilg Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 2 Aufl. **21**: 438. 1925. — *Stigmarota* Lour. Fl. Cochinch. **2**: 633. 1970.

乔木或灌木，通常有刺。单叶，互生，有短柄，边缘有锯齿稀全缘；托叶通常缺。花小，单性，雌雄异株稀杂性，总状花序或团伞花序，顶生或腋生；萼片小，4—7片，覆瓦状排列；花瓣缺；花盘肉质，全缘或有分离的腺体；雄花的雄蕊多数，花药丁字着生，2室，纵裂；退化子房缺；雌花的子房基部有围绕的花盘，为不完全的2—8室，每个侧膜胎座上有叠生的胚珠2颗，花柱和胎座同数，分离或基部稍联合，柱头稍缺或为2裂。浆果球形；种子椭圆形，压扁，种皮软骨质，子叶圆形。

属名模式：大果刺篱木 *Flacourtia ramontchii* L'Hérit.

本属约15—17种；主产热带亚洲和非洲，东达澳大利亚北部、美拉尼西亚至斐济；我国有5种，产福建、广东、海南、广西、贵州和云南等省区，以云南为多。

分种检索表

1. 花柱连合，至少基部连合；果实有棱 1. 云南刺篱木 *F. jangomas* (Lour.) Rauschel
1. 花柱分离，在果顶排列成一环；果实无棱。
 2. 乔木，高5—15米；叶片较大，通常长9—16厘米，叶缘全部有粗锯齿，基部圆形或宽楔形；萼片两面有毛；花盘8裂。
 3. 枝刺粗壮，分叉；浆果球形，直径达2厘米，有浅槽 2. 大叶刺篱木 *F. rukam* Zoll. et Mor.
 3. 枝刺较小，不分叉；浆果卵状长圆形，直径约1厘米，无沟槽 3. 山刺子 *F. montana* F. Grah.
 2. 大灌木，高2—4厘米；叶片较小，通常长2—4厘米，叶缘基部1/3—1/2无锯齿，基部楔形或狭楔形；萼片内面无毛。
 4. 叶片倒卵形至卵状长圆形，叶缘基部1/2无锯齿，先端圆形；浆果较小，直径0.8—1.2厘米，种子12粒 4. 刺篱木 *F. indica* (Burm. f.) Merr.
 4. 叶片椭圆形至椭圆状长圆形，叶缘基部1/3无锯齿，先端渐尖；浆果较大，直径2—3厘米；

种子 4—6 粒 5. 大果刺篱木 *F. ramontchii* L'Hérit.

1. 云南刺篱木 (西南林学院学报) 图版 9: 12—14

Flacourtia jangomas (Lour.) Rauschel. in Nomencl. Bot. ed. 3: 290. 1797; Miq. Fl. Ind. Bat. 1: 105. 1859; Merr. Comm. Lour. 274. 1935; Sleum. in Van Steenis, Fl. Malesiana ser. 1. 5 (1): 72, fig. 30. 1954; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam 11: 36, pl. 4: 1—5. 1970; G. S. Fan in Journ. Southwest For. Col. 8 (2): 132. 1988. — *Stigmarota jangomas* Lour. Fl. Cochinch. 2: 634. 1790. — *Flacourtia cataphrcta* Roxb. ex Willd. Sp. pl. 4: 830. 1806; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 193. 1872; Kurz. For. Fl. Burma 1: 74. 1887; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gen. Indo-Chine 1: 233. 1909.

落叶小乔木或大灌木，高 5—10 米稀达 15 米；枝通常无刺，幼枝有单一或分叉的刺，树皮坚硬，光滑，黄褐色或棕褐色，片状剥落，无毛或微被短柔毛，皮孔椭圆形至圆形。叶通常膜质；卵形至卵状椭圆形稀卵状披针形，长 5—12 厘米，宽 2—2.5 厘米，先端钝或渐尖，基部楔形至圆形，边缘全缘或有粗锯齿，上面有光泽，下面暗绿色，中脉两面稍突起，侧脉 3—6 对，纤细，斜出，在上面明显，通常在脉上有短柔毛；叶柄纤细，长 4—8 毫米，有短柔毛。聚伞花序，腋生，长 1—2 厘米，有毛；花白色至浅绿色，有甜味；花梗短，长 0.5—1 毫米，多少有毛；苞片长约 1 毫米，全缘，无毛或有睫毛；萼片 4—5 片，卵状三角形，长约 2 毫米，先端渐尖，基部钝形，边有睫毛，外面有毛；雄花：花盘圆形，不连合；雄蕊多数，花丝丝状，长 2—3 毫米，无毛，花药卵形至近圆形；雌花：花盘稍全缘或多少分离；子房近圆形，长 2—3 毫米，4—6 室，每室有 2 颗胚珠，花柱 4—6，连合，长约 1 毫米，柱头极短，稍膨大，2 裂，反折。果实肉质，近球形，浅棕色或紫色，直径 1.5—2.5 厘米，有棱，顶端有 1 个宿存短花柱；种子 4—6 粒，稀 10 粒。花期 4—5 月，果期 5—10 月。

产云南南部 (西双版纳)、广西西部 (龙津)、海南南部 (崖县)。生于海拔 700—800 米的山地雨林、常绿阔叶林中。老挝、越南、泰国、马来西亚也有分布。

2. 大叶刺篱木 (海南植物志) 山桩、牛牙果 (广西)，罗庚梅 (台湾高等植物彩色图志)，罗庚果 (台湾树木志) 图版 9: 9—11

Flacourtia rukam Zoll. et Mor. in Mor. Syst. Verz. 2: 33. 1846; Miq. Pl. Jungh. 4000. 1855; Clos in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 4, 8: 216. 1857; Hook. f. et Thoms. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 1: 192. 1872; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 1: 234. 1909, et Suppl. 1: 212. 1939; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 132. 1927; C. E. C. Fischer in Kew Bull. 1932: 176. 1932; Sleum. in Van Steenis, Fl. Malesiana ser. 1, 5 (1): 73, fig. 31—33. 1954; 海南植物志 1: 457. 1964; M. Lescot in Fl. Cambodge Laos et Vietnam 11: 39. 1970; 中国高等植物图鉴 2: 925, 图