

- 9a. 中国旌节花 (原变种) *S. chinensis* Franch. var. *chinensis*
13. 叶片近圆形。
14. 叶片先端具长 5—6 毫米渐尖
- 9b. 宽叶旌节花 (变种) *S. chinensis* var. *latus* H. L. Li
14. 叶片先端微凹, 具长 1—1.5 厘米的线状渐尖
- 9c. 骤尖叶旌节花 (变种) *S. chinensis* var. *cuspidatus* H. L. Li
12. 叶片长圆状卵形, 两面沿中脉被伸展的长柔毛, 或近无毛; 花被片果时宿存
- ... 9d. 短穗旌节花 (变种) *S. chinensis* var. *brachystachyus* C. Y. Wu et S. K. Chen
9. 叶片长圆形或长圆状披针形, 稀卵形, 长为宽的 2 倍或 2 倍以上
- 10. 西域旌节花 *S. himalaicus* Hook. f. et Thoms ex Benth.
1. 柳叶旌节花 (峨眉植物图志) 小通花 (四川中药志), 通花 (中国高等植物图鉴), 铁泡桐 (四川)

Stachyurus salicifolius Franch. in Journ. de Bot. 12: 253. 1898; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 176. 1924; H. L. Li in Bull. Torr. Bot. Club 70 (8): 620. 1943; 峨眉植物图志 1 (2): pl. 97. 1944; 中国高等植物图鉴 2: 930, 图 3590. 1972; S. K. Chen in Acta Bot. Yunnan. 3 (2): 126. 1981; 云南植物志 3: 340, 图版 98, 图 1—2. 1983; Y. C. Tang et al. in Acta Phytotax. Sin. 21 (3): 246. 1983; 中国树木志 2: 1927, 图 982: 1—3. 1985; 四川植物志 3: 259, 图版 80: 3—4. 1985.

1a. 柳叶旌节花 (原变种) 图版 19: 1—3

var. *salicifolius*

常绿灌木, 高 2—3 米。树皮褐色或紫褐色; 小枝光滑无毛, 当年生枝绿色或黄绿色, 老枝圆柱形, 绿褐色或紫红色。叶革质或厚纸质, 线状披针形, 长 7—16 厘米, 宽 1—2 厘米, 先端渐尖, 基部钝至圆形; 边缘具不明显内弯的疏齿, 上面绿色, 下面淡绿色, 两面均无毛; 中脉在两面均凸起, 侧脉 6—8 对, 下一侧脉与上一侧脉在边缘多少网结, 并与中脉平行, 上面稍凹, 下面凸起, 网脉在上面下陷, 下面不明显; 叶柄长约 4 毫米。穗状花序腋生, 长 5—7 厘米, 直立或下垂, 具短梗, 梗长约 6 毫米, 基部无叶; 花黄绿色, 长 5—6 毫米, 无梗; 苞片 1 枚, 三角状卵形, 急尖, 长约 2 毫米, 小苞片 2 枚, 卵形, 长约 2 毫米, 急尖, 具缘毛; 萼片 4 枚, 卵形, 长约 4 毫米, 宽约 3 毫米, 顶端钝, 具缘毛; 花瓣 4 枚, 倒卵形, 长约 5 毫米, 宽约 4 毫米, 顶端钝或近圆形; 雄蕊 8 枚, 与花瓣等长; 子房瓶状, 被短柔毛, 柱头头状, 不露出花瓣。果实球形, 直径 5—6 毫米, 具宿存花柱; 果梗长约 2.5 毫米。染色体数目 $2n=24$ 。花期 4—5 月, 果期 6—7 月。

产四川西部及东南部、云南东北部、贵州和广东等地。生于海拔 1300—2000 米的山坡阔叶混交林下或灌木丛中。模式标本采自云南盐津凤山。