

## 1b. 披针叶旌节花 (变种) (云南植物研究)

var. **lancifolius** C. Y. Wu ex S. K. Chen in Acta Bot. Yunnan. **3** (2): 127. 1981; 云南植物志 **3**: 340. 1983. — *S. salicifolius* Franch. ssp. *lancifolius* (C. Y. Wu) Y. C. Tang et al. in Acta Phytotax. Sin. **2** (3): 247. 1983.

本变种与原变种的区别在于: 叶片纸质, 长圆状披针形, 不为线状披针形, 长为宽的4倍, 侧脉于边缘网结, 易于区别。

产四川东南、云南东北及贵州 (绥阳)。生于海拔800—1900米的山坡、山谷溪边杂木林中。模式标本采自云南永善。

## 2. 云南旌节花 (峨眉植物图志) 滇旌节花 (云南)

**Stachyurus yunnanensis** Franch. in Journ. de Bot. **12**: 253. 1898; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **1**: 288. 1912; et in Journ. Arn. Arb. **15**: 103. 1934; Chung in Men. Sci. Soc. China **1**: 176. 1924; Hand. -Mazz. Symb. Sin. **7**: 383. 1931; H. L. Li in Bull. Torr. Bot. Club **70** (6): 618. 1943; 峨眉植物图志 **1** (2): pl. 98. 1944; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. **27**: 7. 1966; 中国高等植物图鉴 **2**: 929, 图3588. 1972; S. K. Chen in Acta Bot. Yunnan. **3** (2): 127. 1981; 云南植物志 **3**: 342, 图版99, 图1—2. 1983; Y. C. Tang et al. in Acta Phytotax. Sin. **21** (3): 237. 1983; 中国树木志 **2**: 1928, 图982: 4—5. 1985. — *S. esquirolii* Lévl. Fl. Kouy-Tcheou 416. 1915.

## 2a. 云南旌节花 (原变种) 图版19: 4—8

var. **yunnanensis**

常绿灌木, 高1—3米; 树皮暗灰色, 光滑; 枝条圆形, 当年生枝为绿黄色, 二年生枝棕色或棕褐色, 具皮孔。叶革质或薄革质, 椭圆状长圆形至长圆状披针形, 长7—15厘米, 宽2—4厘米, 先端渐尖或尾状渐尖, 基部楔形或钝圆, 边缘具细尖锯齿, 齿尖骨质, 上面绿色, 具光泽, 下面淡绿色, 紫色, 两面均无毛, 中脉在下面明显凸起, 侧脉5—7对, 在两面均不明显, 细脉网状; 叶柄粗壮, 长1—2.5厘米。总状花序腋生, 长3—8厘米, 花序轴之字形, 具短梗, 长约7毫米, 有花12—22朵; 花近于无梗; 苞片1枚, 三角形, 急尖, 长约1.5毫米; 小苞片三角状卵形, 急尖, 长约2.5毫米; 萼片4枚, 卵圆形, 长约3.5毫米; 花瓣4枚, 黄色至白色, 倒卵圆形, 长5.5—6.5毫米, 宽约4毫米, 顶端钝圆; 雄蕊8枚, 无毛; 子房和花柱长约6毫米, 无毛, 柱头头状。果实球形, 直径6—7毫米, 无梗, 具宿存花柱, 苞片及花丝的残存物。染色体数目  $2n=24$ ; 花粉具三拟孔沟。花期3—4月, 果期6—9月。

产湖南、湖北、四川、贵州、云南和广东北部。生于海拔800—1800米的山坡常绿阔叶林下, 或林缘灌丛中。模式标本采自云南洱源孟获营。

本种产于贵州者, 其间有许多是与矩圆叶旌节花 *S. oblongifolius* Wang et Tang 的