

上面亮绿色，无毛，下面被白色柔毛，老时不脱落；侧脉 5—6 对，上升，于边缘网结，两面均明显凸起；叶柄长 1—2 厘米。总状花序腋生，长 2—5 厘米，下垂，几乎无总梗，基部具叶（或结果时无叶）；花无梗；苞片 1 枚，宽三角状卵形，长约 2 毫米，小苞片 2 枚，卵形，顶端急尖；萼片 4 枚，淡绿色，卵形；花瓣淡黄色，倒卵形，顶端钝至近圆形，雄蕊 2 轮，外轮 4 枚较长，长约 5 毫米，内轮 4 枚较短，长约 4 毫米；子房卵形，无毛；花柱较子房长，柱头头状，不露出花冠。果实球形，直径约 6 毫米，近无梗。染色体数目 $2n=24$ 。花期 5 月，果期 7 月。

产四川（峨眉山、雷波）、云南（镇雄、彝良），分布极为局限。生于海拔 1600—2000 米的山坡杂木林中。模式标本采自四川峨眉山。

本种与四川旌节花 *S. szechuanensis* Fang 极近似，唯后者叶片倒卵形至长圆状倒卵形，较小，长 4—8 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，下面无毛，可资区别。

8. 四川旌节花（峨眉植物图志）

Stachyurus szechuanensis Fang, 峨眉植物图志 2 (1): pl. 103. 1945; et in Journ. West. China Border Res. Soc. 15. ser. B. 182. 1945; S. K. Chen in Acta Bot. Yunnan. 3 (2): 130. 1981; Y. C. Tang et al. in Acta Phytotax. Sin. 21 (3): 248. 1983; 中国树木志 2: 1932. 1985; 四川植物志 3: 269, 图版 82: 4. 1985.

小乔木，高 5 米。树皮深褐色，光滑；小枝圆柱形，无毛，当年生枝绿色，老枝绿褐色；冬芽圆锥形，鳞片 4—5 枚，卵形，无毛。叶厚革质，长圆状椭圆形，椭圆形至圆状椭圆形，有时稍成倒卵状椭圆形，长 4—8 厘米，宽 2.5—4.5 厘米，先端圆钝或钝，基部钝至近圆形，边缘具疏微齿，稍反卷，侧脉 5—7 对，上面不明显，下面显著；叶柄长 1—2 厘米，无毛，上面有沟槽，下面浑圆。总状花序腋生，下垂，长约 2 厘米；花不详。浆果，卵圆形，直径约 6 毫米，果梗长约 2 毫米，具宿存柱头。

产四川盆地西缘山地。生于山坡灌木丛中，海拔可达 2500 米。模式标本采自四川荣经瓦屋山。

本种分布极为局限，其体态与凹叶旌节花 *S. retusus* Yang 极近似，唯叶片倒卵形至长圆状倒卵形，先端圆形或钝，但绝非凹形，下面无毛；果序较短，长约 2 厘米而不同。

9. 中国旌节花（峨眉植物图志） 水凉子（中国树木分类学），萝卜药（河南），旌节花（广群芳谱）

Stachyurus chinensis Franch. in Journ. de Bot. 12: 254. 1898; Diels in Bot. Jahrb. 29: 475. 1900; Lecomte. Fl. Gén. Indo-Chine 1: 353, pl. 33, fig. 12—18. 1910; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 1: 287. 1912, et in Journ. Arn. Arb. 8: 178. 1927; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 176. 1924; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 7: 316. 1931; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 383. 1931; 陈嵘，中国树木分类学