

44. 花萼长约 1.5 厘米, 外面被丝状平贴长柔毛; 叶披针形至椭圆状披针形, 或椭圆形, 长 2—5 厘米, 宽 0.8—1.6 厘米, 先端尖, 基部圆形或宽楔形, 侧脉每边 5—6 条, 在下面突出 27. 堇花 *W. canescens* (Wall.) Meisn.
44. 花萼长约 1.2 厘米, 外面密被平贴短柔毛, 叶椭圆形、长圆形至倒披针形, 长 1.5—3 厘米, 宽 0.5—1 厘米, 先端尖, 基部楔形, 侧脉每边约 3—4 条, 纤细, 不明显 29. 丽江堇花 *W. lichiangensis* W. W. Smith

组 1. 堇花组 Sect. *Wikstroemia*——Sect. *Euwikstroemia* Meisn. in DC. Prodr. 14: 543. 1857; Gilg in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (6a): 235. 1894. am-pl.

花萼多无毛, 在花后脱落; 花序近头状或簇生或成短穗状花序。核果较大, 裸露, 多浆汁。

本组有下列 16 种。

1. 光叶堇花 (中国经济植物志) 山荆 (浙江)

Wikstroemia glabra Cheng in Contr. Biol. Lab. Sci. Soc. China, Bot. ser. 6: 69. 1931; A. Steward, Manual Vascular Plants Lower Yangtze Valley 266. 1958; 中国经济植物志 276, 图 236. 1961.

1a. 光叶堇花 (原变型) 图版 47: 5—6

f. *glabra*

灌木, 高 1.5 米, 小枝具棱角, 绿色, 无毛, 二年生枝黑紫色, 树皮多少成龟裂, 小芽近圆形, 被绒毛, 凋落。叶膜质, 互生, 卵形、椭圆形或长圆状椭圆形, 长 2—3.3 厘米, 宽 1—1.8 厘米, 先端钝、尖或短渐尖, 有时凹缺, 基部楔形、宽楔形、圆形或截形, 全缘, 边缘略反卷, 上面无毛, 幼时在下面密被柔毛, 后逐渐变为无毛, 侧脉每边 5—10, 紫色或绿色, 在下面明显; 叶柄长约 2 毫米, 绿色, 无毛。花白色, 通常 5 花组成顶生头状花序 (也有由 2—6 花组成), 花序梗长 5—12 毫米, 无毛, 花萼长 10—12 毫米, 两面均无毛, 裂片 4, 卵形, 宽圆形, 顶端略尖, 长及宽均 4—5 毫米, 水平展开, 直径约 1 厘米; 雄蕊 8, 2 列, 上列不超过花萼筒喉部, 下列插在花萼筒中部, 花药长 1—1.2 毫米; 子房无柄, 约长 3 毫米, 在上部被短柔毛, 花柱短, 柱头头状, 花盘鳞片 1—3 枚, 线形, 2 齿裂或微缺, 少有为钝形, 约等于子房长的 1/3 或稍长。花期夏季。

产安徽、浙江、四川。海拔 1000 米左右的林下或开旷向阳处。模式标本采自浙江东天目山。

茎皮含纤维素 29.23%, 可制高级文化用纸。