

480. 1900; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. 2: 537. 1916.

21a. 互生叶堇花 (原变种)

var. *alternifolia*

灌木; 小枝灰白色, 圆柱形, 嫩枝被柔毛。叶互生, 薄草质, 披针形至倒披针形, 长 3—3.8 厘米, 宽 0.9—1.2 厘米, 两面均略被疏柔毛, 侧脉不明显, 中脉在下面稍凸出; 叶柄短, 约长 1.5 毫米, 被疏柔毛。花序顶生, 花无梗, 或仅具花序梗, 短于叶, 花黄色纤细, 长 1—1.1 厘米, 直径约 2 毫米, 外面被紧贴的疏柔毛, 花萼裂片短, 顶端圆平, 微啮蚀状, 比花萼筒短 4—5 倍, 花药上列稍外露, 下列在花被管中部以下着生, 子房狭长圆形, 密被长柔毛, 柱头黄色, 头状, 花盘鳞片 1 枚, 线形, 顶端 3 平平裂, 比子房短 2 倍。

产甘肃及四川北部。模式标本采自 Heiho (黑河峡谷)。

本种尚未见到标本, 仅依原描述摘录。

本种依据外部形态描述很像 *W. ligustrina* Rehd., 但因掌握的资料不充分, 尚不敢断定。

21b. 多花互生叶堇花 (变种)

var. *multiflora* Lecomte in Not. Syst. 3: 130. 1915.

与原变种的不同为花多而较长大。

产云南。模式标本采自云南洱沱摩掌营。

未见到标本。

22. 北江堇花 (中山大学学报)

黄皮子、土坝天 (江西大余), 地棉根、山谷麻 (江西寻乌、广西大瑶山), 山谷皮 (江西遂川), 山花皮 (湖北武岗), 山棉皮 (广西资源、龙胜)

*Wikstroemia monnula* Hance in Journ. Bot. 16: 13. 1878; Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb. 31: 98. 1886; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 399. 1894; Dunn et Tutcher in Kew Bull. Misc. Inform. add. ser. 10: 227. 1912; 蔡少兰, 中山大学学报 5 (2): 104. 1956; 中国高等植物图鉴 2: 959, 图 3648. 1972; 贵州植物志 3: 184. 1986. 广西植物志 1: 620, pl. 256, fig. 5—6. 1991. ——*W. stenantha* Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 26: 400. 1894; Dunn et Tutcher in Kew Bull. Misc. Inform. Add. Ser. 10: 227. 1912. ——*W. nutans* auct. non Champ.: 蔡少兰, 中山大学学报 5 (2): 104. 1956, quoad W. T. Tsang 20554.

22a. 北江堇花 (原变种)

var. *nonnula*

灌木, 高 0.5—0.8 米; 枝暗绿色, 无毛, 小枝被短柔毛。叶对生或近对生, 纸质