

又分枝；花盘杯状，顶端不规则深裂，裂齿大小不等，长为花盘的1/2，子房无毛，花柱长0.7—1毫米，幼时密被黄褐色纤毛，以后脱落。

产重庆（缙云山）。模式标本采自缙云山。

根或全株民间泡酒服，可强筋骨和治腰痛。

## 29. 台湾瑞香（台湾植物志） 图版66：1—3

*Daphne arisanensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. **2**: 126. 1912; Kanehira, Formos. Trees, ed. Rev. 481, f. 344. 1936; H. L. Li, Woody Fl. Taiwan 614. 1963; 李惠林, 台湾植物志 **3**: 746. 1977.


亚灌木，高2—3米，多分枝；枝纤细，灰色，疏松开展，顶部被绒毛，具多数小疤痕。叶互生或近于对生，膜质或纸质，披针形或椭圆形，长4.5—7厘米，宽0.5—1.3厘米，先端渐尖，尖头稍凹下或钝形，基部渐狭成楔形，边缘全缘，稍反卷，中脉在上面凹下，下面隆起，侧脉极纤细，在上面不甚明显，下面稍明显；叶柄长3—10毫米，暗红色，微翅状，基部稍扩大。花白色或黄色，2—7花组成头状花序，顶生，稀腋生；苞片披针形，长5毫米，边缘具长缘毛，易脱落；花梗长2毫米，具关节，关节以下微被柔毛；花萼筒无毛，包围子房的花萼筒壶状，长4毫米，基部圆形，上部花萼筒钟状，长6毫米，裂片4，卵状三角形，覆瓦状排列，每2枚内外成对着生，顶端钝形，边缘反卷，基部收缩成耳状，长和宽各为2毫米；雄蕊8，2轮，下轮着生于花萼筒的中部，上轮着生于花萼筒喉部下面，花丝丝状，长0.3毫米，花药线形，长1毫米，顶端具尖头，基部稍凹下；子房长圆状卵形，长3.5毫米，直径2毫米，上部多少渐狭于柱头下面，花柱短或几无，柱头顶部具紧贴的圆形斑点，直径0.2毫米，具不明显的槽沟。果实卵形，长7毫米，直径4毫米，顶端具尖头，柱头宿存，黄色或红色；种子1颗，卵形，长5毫米，顶端急尖，基部圆钝形，种皮脆壳质，具1白色条纹。

产台湾。模式标本采自台湾阿里山。

本种与唐古特瑞香 *D. tangutica* Maxim. 相近，不同之处在于枝纤细；叶互生或近于对生；花小，白色或黄色。

## 30. 瑞香（郭橐驼种树书） 睡香、露甲、风流树（群芳谱），蓬莱花（花镜），千里香、瑞兰（亨利氏中国种子植物名录），沈丁花、蓬莱紫、夺皮香（新本草纲目）

*Daphne odora* Thunb. Fl. Jap. 159. 1784; Sims in Curtis's Bot. Mag. **38**: t. 1587. 1813; Keiss. in Bot. Jahrb. **25**: 89. 1898; Matsum. et Hayata, Pl. Formos. 354. 1906; Rehd. in Sarg. Pl. Wils. **2**: 545. 1916; H. Winkl. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. **12**: 441. 1922; Kanehira, Formos. Trees, ed. Rev. 482. 1936. —*D. triflora* Lour. Pl. Cochinch. **1**: 236. 1790. —*D. japonica* Thunb. in Mus. Acad. Upsal. **13**: 106. 1792. —*D. mazeli* Carr. in Rev. Hort. **1872**: 392. t. 1872. —*D. odora* Thunb. var. *mazeli* (Carr.) Hemsl. in Gardeni-



图版 66 1—3. 台湾瑞香 *Daphne arisanensis* Hayata: 1. 花枝; 2. 花; 3. 果实。4—7. 短管瑞香 *Daphne brevituba* H. F. Zhou ex C. Y. Chang; 4. 果枝; 5. 花; 6. 花纵剖面; 7. 雄蕊。(冯先洁绘)