

1913. — *Stellera chamaejasme* Linn. var. *angustifolia* Diels in Not. Bot. Gard. Edinburgh. 7: 88. 1912.

多年生草本，高20—50厘米；根茎木质，粗壮，圆柱形，不分枝或分枝，表面棕色，内面淡黄色；茎直立，丛生，不分枝，纤细，绿色，有时带紫色，无毛，草质，基部木质化，有时具棕色鳞片。叶散生，稀对生或近轮生，薄纸质，披针形或长圆状披针形，稀长圆形，长12—28毫米，宽3—10毫米，先端渐尖或急尖，稀钝形，基部圆形至钝形或楔形，上面绿色，下面淡绿色至灰绿色，边缘全缘，不反卷或微反卷，中脉在上面扁平，下面隆起，侧脉4—6对，第2对直伸直达叶片的2/3，两面均明显；叶柄短，长约1.1毫米，基部具关节，上面扁平或微具浅沟。花白色、黄色至带紫色，芳香，多花的头状花序，顶生，圆球形；具绿色叶状总苞片；无花梗；花萼筒细瘦，长9—11毫米，具明显纵脉，基部略膨大，无毛，裂片5，卵状长圆形，长2—4毫米，宽约2毫米，顶端圆形，稀截形，常具紫红色的网状脉纹；雄蕊10，2轮，下轮着生于花萼筒的中部以上，上轮着生于花萼筒的喉部，花药微伸出，花丝极短，花药黄色，线状椭圆形，长约1.5毫米；花盘一侧发达，线形，长约1.8毫米，宽约0.2毫米，顶端微2裂；子房椭圆形，几无柄，长约2毫米，直径1.2毫米，上部被淡黄色丝状柔毛，花柱短，柱头头状，顶端微被黄色柔毛。果实圆锥形，长5毫米，直径约2毫米，上部或顶部有灰白色柔毛，为宿存的花萼筒所包围；种皮膜质，淡紫色。花期4—6月，果期7—9月。

产我国北方各省区及西南地区。生于海拔2600—4200米的干燥而向阳的高山草坡、草坪或河滩台地。俄罗斯西伯利亚也有分布。

狼毒的毒性较大，可以杀虫；根入药，有祛痰、消积、止痛之功能，外敷可治疥癣。根还可提取工业用酒精，根及茎皮可造纸。

## 2. 台湾狼毒（新拟） 矮瑞香（台湾植物志）

*Stellera formosana* Hayata ex Li, Woody Fl. Taiwan 619. 1963; et in Fl. Taiwan 3: 749. 1977. — *Chamaejasme formosana* Hayata, Gen. Ind. Fl. Formos. 64. 1917. nom. — *Stellera chamaejasme* auct. non Linn.: Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 25 (19): 190. 1908.

小灌木，无毛；小枝分枝，纤细，直立，坚硬，圆柱形。叶互生或对生，长椭圆形或倒卵状披针形，长2—3厘米，宽0.5—1厘米，先端钝形或圆形，通常凹下，基部下延于叶柄，楔形，边缘全缘，反卷，中脉在上面扁平，下面隆起，侧脉4—5对，两面不甚明显；叶柄短，翅状。花3—5朵簇生于小枝腋部或无叶处；无梗，无苞片；花萼筒纤细，无毛，筒状，长5—6毫米，裂片4，卵形，长约2.5毫米，开展，顶端钝尖；雄蕊8，2轮，下轮着生于花萼筒的中部，上轮着生于花萼筒的喉部稍下面，花药稍伸出喉部，花丝短，花药长圆形，顶端急尖；花盘环状，偏向一边；子房椭圆形，长2.5

毫米，直径约 1 毫米，无毛，花柱短，柱头头状，具乳状突起。果实未见。

产台湾南湖大山。生于海拔 3500—3700 米的高山顶部，为我国台湾特有种。

## 10. 假狼毒属 *Stelleropsis* Pobed.

Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS. **12**:

148. 1950. et Fl. URSS. **15**: 510. 1949.

落叶亚灌木或多年生草本，茎直立，不分枝或少分枝，通常基部木质。叶互生，椭圆形、线形或披针形，全缘。头状花序或短穗状花序顶生，通常无叶状苞片；花梗极短，与花萼筒基部之间具关节；花萼筒通常漏斗状圆筒形，长 8—12 毫米，花后在子房上面微收缩，具关节，关节之下卵形或锥形至倒锥形，宿存，关节之上倒锥形至圆筒形，以后脱落，裂片 4；雄蕊 8，2 轮，生于花萼筒关节之上，上轮雄蕊与花萼裂片对生；花盘环状，倾斜，边缘不规则波状或圆齿状，子房顶端有长柔毛，花柱丝状。果实干燥，包被于花萼筒内。

属名模式：阿尔泰假狼毒 *Stelleropsis altaica* (Thunb.) Pobed.

本属有 10 种，主要产于中亚地区。我国有 2 种，产新疆。

### 分种检索表

1. 花序为稍伸长的穗状花序，花萼筒长 8—10 毫米；叶片长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，顶端钝形  
..... 1. 阿尔泰假狼毒 *S. altaica* (Thunb.) Pobed.
1. 花序为头状花序，花萼筒长 10—12 毫米；叶片长 14—20 毫米，宽 3—5 毫米，顶端渐尖或急尖…  
..... 2. 天山假狼毒 *S. tianschanica* Pobed.

#### 1. 阿尔泰假狼毒 (新疆植物名录)

*Stelleropsis altaica* (Thieb.) Pobed. in Not. Syst. Herb. Inst. Bot. Acad. Sci. URSS **12**: 148. 1950. — *Stellera altaica* Thieb. in Pers. Syn. **1**: 436. 1805. — *Passerina racemosa* Wikstr. in Acta Holm. 324. 1818. — *Wikstroemia altaica* (Thieb.) Domke in Biblioth. Bot. **3**: 59. 1934, p. p. — *Dianthron altaica* (Thieb.) Kit Tan in Not. Bot. Gard. Edinb. **40**: 219. 1982.

多年生直立草本，高 20—50 厘米；根茎木质，少分枝，褐色；茎单一，直立，不分枝，基部稍木质，具较多的叶痕迹。叶密，散生，草质，椭圆形，长 20—25 毫米，宽 5—10 毫米，先端钝形或急尖，基部楔形，稀钝圆形，边缘全缘，两面绿色，无毛，中脉明显，侧脉 3—5 对，近基部一对通常较长，两面有时明显；叶柄短，长 1—1.5 毫米。花带红色，芳香，穗状花序初较短，后伸长，长 3—7 厘米；花萼筒细圆筒状，长