

长 1.1 毫米;花柱直立,无毛,上端弯曲,达裂片的一半以上,柱头粗短。果实阔椭圆形或倒卵状阔椭圆形,长 15—22 毫米,直径约为长的一半,幼时被黄褐色鳞片,成熟时黄红色,顶端常有干枯的萼筒宿存;果梗长 12—25 毫米,直立或稍弯曲。花期 10—11 月,果期次年 2—3 月。

产湖南南部、广东、广西、云南;生于海拔 1000 米以下的热带和亚热带地区。中南半岛也有分布。模式标本采自广东沿海岛屿。

全株均可入药。果实可食,生津止渴,可治肠炎、腹泻;全株治痢疾、跌打、瘀积;叶治肺病、支气管哮喘、感冒咳嗽。

本种花单生,果梗花后伸长,达 12—25 毫米,萼筒显著四角形(角柱状),长 4—6 毫米,裂片长 3.5—4.5 毫米;叶片干燥后上面多少带绿色,网状脉在上面极明显,易于认识。

7. 台湾胡頹子 (中国高等植物图鉴)

Elaeagnus formosana Nakai in Bot. Mag. Tokyo 30: 76. 1916; Kanehira, Formos. Trees Rev. ed. 483. f. 444. 1936; Li in Lloydia 15(3): 160. 1952; Li, Woody Fl. Taiwan 625. 1963; 中国高等植物图鉴 2: 967. 图 3663. 1972.——*E. pungens* auct. non Thunb.; Matsum. et Hayata in Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 356 (Enum. Pl. Formos.) 1916.——*E. nokoensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 92. f. 32-vii. 1920.

常绿直立灌木,无刺;多分枝,不平滑,具叶痕,幼枝被红棕色鳞片,老枝深灰色或黑色。叶厚革质,椭圆形或长椭圆形,长 3—8 厘米,宽 1—3 厘米,顶端钝形或急尖,基部圆形或阔楔形,边缘反卷,上面幼时被鳞片,成熟后脱落,具光泽,干燥后深褐色,下面银白色,密被银白色和散生褐色鳞片,侧脉 6—8 对,上面明显凸起,近边缘分叉而互相连接,下面略明显,网状脉在上面甚明显,下面不清晰;叶柄长 5—10 毫米。花白色,外面密被银白色鳞片,常 3—5 花簇生叶腋短小枝上成总状花序,花枝锈色,长 2—6 毫米,花后发育成枝叶;花梗极短,长 1—2 毫米;萼筒杯状或角柱状四角形,上下等阔,长 3—4 毫米,宽 3 毫米,在裂片下面收缩,子房上骤收缩,裂片宽三角形,与萼筒等长或稍短,顶端钝尖,内面无毛或散生白色星状短柔毛;雄蕊的花丝极短,花药矩圆形,长 1.5 毫米;花柱直立,微弯曲,无毛,不超雄蕊。果实长椭圆形,长 12—15 毫米,直径 5 毫米,密被枇杷状锈色鳞片;果梗长 5—7 毫米。花期 10—11 月,果期次年 2—3 月。

产我国台湾。模式标本采自台湾中部。

本种与胡頹子 *E. pungens* Thunb. 相近,区别在于本种的萼筒杯状或角柱状四角形,长 3—4 毫米,裂片几与萼筒等长,花梗极短而不同。

8. 越南胡頹子

Elaeagnus tonkinensis Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 391. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 99. 1909; Lecomte in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris