

产云南北部;生于海拔2000—2200米的地区。模式标本采自云南双柏。

本种与福建胡颓子 *E. oldhami* Maxim. 相近,区别在于本种的叶片为椭圆形,基部圆形,或钝形;萼筒短钟形,长4毫米,具4肋,裂片长2毫米而不同。

14. 薄叶胡颓子 图版 4: 1—3

Elaeagnus thunbergii Serv. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 8: 482. 1908 et in Bot. Centralbl. Beih. 25: 65. 1909; Lecomte in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, 21: 165. 1915; Nakai in Bot. Mag. Tokyo 30: 76. 1916; Kanehira, Formos. Trees Rev. ed. 487. f. 449. 1936; Li in Llyodia 15 (3): 157. 1952; Li, Woody Fl. Taiwan 622. 1963.——*E. erosifolia* Hayata, Icon. Pl. Formos. 9: 88. 1920.——*E. oiwakensis* Hayata, op. cit. 9: 92. 1920.

常绿直立灌木,无刺;枝细弱伸长,多分枝,幼枝稍扁,密被锈色鳞片,老枝鳞片脱落,黑色,具细条纹。叶薄纸质或膜质,阔椭圆形,长4—6厘米,宽2—2.7厘米,顶端钝形或钝尖,基部楔形,边缘略不规则,波状,上面幼时具白色鳞片,成熟后脱落,干燥后暗褐色或黑褐色,下面淡白色,密被银白色和散生少数褐色鳞片,微具光泽,侧脉6—8对,两面均略明显;叶柄锈色,长9—13毫米。花灰白色,密被银白色和散生少数锈色大鳞片,下垂或开展,1—5花簇生叶腋短小枝上,花枝锈色,长约1.5毫米;苞片锈色,早落;花梗长1—2毫米;萼筒圆筒状钟形,长4.5—5毫米,向基部略窄狭,在子房上明显收缩,裂片三角形或卵状三角形,长2.5—3毫米,宽与长略相等,顶端渐尖,内面疏生白色星状柔毛;雄蕊4,花丝极短,花药矩圆形,长1.2毫米,达裂片的1/2;花柱纤细,直立或稍弯曲,疏生白色星状柔毛,不超过或超过雄蕊。果实未见。花期8—9月。

产我国台湾。模式标本采自台湾。


本种与福建胡颓子 *E. oldhami* Maxim. 相近,区别在于本种的叶片为广椭圆形,两端钝尖;萼筒圆筒状钟形,长4—4.5毫米,裂片长2.5—3毫米而不同。

少果胡颓子 *Elaeagnus wilsonii* Li in Llyodia 15 (3): 158. 1952.

“攀援灌木,高3—7米;枝无刺,褐色,幼时具褐色鳞片。叶膜纸质,宽卵形,长4—7.5厘米,宽2.5—5厘米,两端圆形,或顶端钝形,基部稀近急尖,边缘微波状或全缘,上面幼时具银白色鳞片,成熟后脱落,绿色,光亮,下面具银白色鳞片和散生暗黄色斑点,中脉在上面不明显,下面略凸起,侧脉5或6对,上面不明显,下面纤细,微凸起,网状脉不清晰;叶柄长1.2—2厘米,具沟槽,具淡褐色鳞片。花未见。果实单生叶腋,椭圆形,长10毫米,直径4—5毫米,被黄红色鳞片,多少具肋纹;果梗长6毫米,被褐色鳞片。”

产我国台湾的台北。模式标本系 *E. H. Wilson* 采自台北。

李惠林发表本种时,认为与薄叶胡颓子 *E. thunbergii* Serv. 相近。但未见到标本和照片,现无法判断它是否可以成立种,还有待进一步考证。



1—3. 薄叶胡颓子 *Elaeagnus thunbergii* Serv.: 1.花枝; 2.花; 3.花纵切面。
4—6. 文山胡颓子 *Elaeagnus wenshanensis* C. Y. Chang: 4.花枝; 5.花; 6.花纵切面。
(冯先洁绘)