

木半夏分变种检索表

1. 萼筒长 5—7 毫米。
 2. 果实椭圆形;萼筒圆筒形。
 3. 花萼裂片宽卵形;小枝较粗壮,具锈色或褐色(稀淡褐色)鳞片.....50a. 木半夏(原变种) var. *multiflora*
 3. 花萼裂片卵状披针形;小枝纤细;具银白色鳞片.....50b. 细枝木半夏(变种) var. *tenuipes* C. Y. Chang
 2. 果实较小,倒卵形;萼筒漏斗状圆筒形.....50c. 倒果木半夏(变种) var. *obovoidea* C. Y. Chang
1. 萼筒细弱,长 8—10 毫米.....50d. 长萼木半夏(变种) var. *siphonantha* (Nakai) C. Y. Chang

50b. 细枝木半夏 (变种) (四川植物志) 图版 16: 4—6

Elaeagnus multiflora Thunb. var. *tenuipes* C. Y. Chang in Fl. Sichuan 1: 466. 1981.

与原变种的区别在于本变种枝条细弱伸长,具银白色鳞片;叶片较大,羊皮纸质,椭圆形,长 4—9 厘米,宽 2—3.7 厘米,基部圆形,萼筒圆筒形,长 6—6.5 毫米,裂片卵状披针形,长 6 毫米。

产四川(峨眉山);生于海拔 1800 米左右的阴湿岩壁灌木林中。模式标本采自四川峨眉山(九十九道拐)。

果实可生食;果、叶和根可入药,可治痔漏、白浊、清寒表汗、下阴生疮等症;嫩枝叶可作牛、羊和马等家畜饲料。

50c. 倒果木半夏 (变种) (植物研究室汇刊) 图版 16: 7—10


Elaeagnus multiflora Thunb. var. *obovoidea* C. Y. Chang, in Bull. Bot. Lab. Nor.-east. Forest. Inst. 6: 119. 1980.—*E. multiflora* auct. non Thunb.; Pei in Contrib. Biol. Lab. Sci. Soc. China, 9(2): 185. 1934; 裴鉴等,江苏南部种子植物手册, 518. 1959.

与原变种的区别在于本变种萼筒漏斗状圆筒形,长 5—7 毫米,向基部渐窄狭,花柱长不到萼筒喉部的 1/2;果实较小,倒卵形,长 6—10 毫米。同时与日本产的 *E. murakamiana* Makino 亦很相近,但幼枝叶各部均无星状柔毛而不同。

产河南、江苏、浙江、安徽、江西、湖北;生于海拔 50—200 米的空旷地和路旁。模式标本采自江苏宜兴。

50d. 长萼木半夏 (变种) (植物研究室汇刊)

Elaeagnus multiflora Thunb. var. *siphonantha* (Nakai) C. Y. Chang in Bull. Bot. Lab. Nor.-east. Inst. 6: 120. 1980.—*E. siphonantha* Nakai in Anz. Akad. Wien. Mand.-Nat. 61: 85. 1925.—*E. umbellata* Thunb. var. *siphonantha* (Nakai) Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 590. 1933.—*E.*



1—3. 木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb.: 1. 花; 2. 花纵切面; 3. 带叶果枝。4—6. 细枝木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb. var. *tenuipes* C. Y. Chang: 4. 花枝; 5. 花的纵切面; 6. 花。7—10. 倒果木半夏 *Elaeagnus multiflora* Thunb. var. *obovoidea* C. Y. Chang: 7. 果枝; 8. 花; 9. 花纵切面; 10. 果实。(冯先洁绘)