

米,花药椭圆形,褐色,药隔凸尖;子房纺锤形,长约7毫米,基部渐狭成一短柄,柄长2毫米;胚珠5枚,各珠柄彼此稍合生但不等长;花柱长约10毫米,无毛,顶端稍粗厚,柱头略平。果纺锤形,长1.6—2厘米,径4—5毫米,黑褐色,顶端具宿存的萼肢,具纵纹。花期5月,果期6—8月。

产广东海南岛(陵水)海岸边。少见。

分布于亚洲热带、大洋洲北部和波利尼西亚、马来西亚至我国广东海南岛。

2. 榄李 滩疤树(海南岛)

Lumnitzera racemosa Willd. in Gen. Naturf. Freund. Neue Schr. 4: 187. 1803; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 772. 1920; Exell Fl. Males. Ser. 1(4): 588. 1954; 赵爱真,植物分类学报 7: 237. 1958; 海南植物志 2: 43. 1965; O. Lecompte in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 10: 16. 1969; H. L. Li in Fl. Taiwan 3: 875. pl. 850. 1977——*L. coccinea* W. & A. Prodr. 2. 316. 1834.

常绿灌木或小乔木,高约8米,径约30厘米,树皮褐色或灰黑色,粗糙,枝红色或灰黑色,具明显的叶痕,初时被短柔毛,后变无毛。叶常聚生枝顶,叶片厚,肉质,绿色,干后黄褐色,匙形或狭倒卵形,长5.7—6.8厘米,宽1.5—2.5厘米,先端钝圆或微凹,基部渐尖,叶脉不明显,侧脉通常3—4对,上举;无柄,或具极短的柄。总状花序腋生,花序长2—6厘米;花序梗压扁,有花6—12朵;小苞片2枚,鳞片状三角形,着生于萼管的基部,宿存;萼管延伸于子房之上,基部狭,渐上则阔而成钟状或为长圆筒状,长约5毫米,宽约3毫米,裂齿5,短,三角形,长1—2毫米;花瓣5枚,白色,细小而芳香,长椭圆形,长4.5—5毫米,宽约1.5毫米,与萼齿互生;雄蕊10或5枚,插生于萼管上,约与花瓣等长,花丝长4—5毫米,基部略宽扁,上部收缩,顶端弯曲,花药小,椭圆形,药隔凸尖;子房纺锤形,长6—8毫米;花柱圆柱状,上部渐尖,长4毫米;胚珠4枚,扁平,长椭圆形,倒悬于子房室之顶端,珠柄大部分合生而不等长。果成熟时褐黑色,木质,坚硬,卵形至纺锤形,长1.4—2厘米,径5—8毫米,每侧各有宿存的小苞片1枚,上部具线纹,下部平滑,1侧稍压扁,具2或3棱,顶端冠以萼肢;种子1颗,圆柱状,种皮棕色。花果12月至翌年3月。

产广东(徐闻、海南岛)、广西(合浦、防城)及台湾省海岸边。分布于东非热带、马达加斯加、亚洲热带、大洋洲北部和波利尼西亚至马来西亚。印度沿岸不见分布。

5. 使君子属——*Quisqualis* Linn.

Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1: 556. 1762; Benth. et Hook. f. Gen. Pl.

1: 689. 1865; Brandis in Engl. u. Prantl Nat. Pflanzenfam. 3

(7): 125. 1893; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 773.