

1920; Exell et Stace Bol. Soc. Brot. 40: 18. 1966.

木质藤本或蔓生灌木。叶膜质, 对生或近对生, 全缘, 无毛或被毛; 叶柄在落叶后宿存。花较大, 两性, 白色或红色, 组成长的顶生或腋生的穗状花序(稀分枝); 萼管细长, 管状, 脱落, 具广展、外弯、小形的萼片 5 枚; 花瓣 5, 远较萼大, 在花时增大; 雄蕊 10, 成 2 轮, 插生于萼管内部或喉部, 花药丁字着; 花盘狭管状或缺; 子房 1 室, 胚珠 2—4, 倒悬于子房室的顶端; 珠柄有时具乳突, 花柱丝状, 部分和萼管内壁贴生。果革质, 长圆形, 两端狭, 具 5 棱或 5 纵翅, 在翅间具深槽; 种 1, 具纵槽。

约 17 种。产亚洲南部及非洲热带。我国产 2 种。

### 分 种 检 索 表

1. 花序较疏, 花初为白色后转淡红色; 萼管长 5 厘米以上; 花瓣长达 1.8—2.4 厘米; 叶柄长, 无关节 .....
  - ..... 1. 使君子 *Q. indica* Linn.
2. 叶片椭圆形或卵形, 上面无毛, 背面有时疏被棕色柔毛 .....
  - ..... 1a. 使君子(原变种) *Q. indica* Linn. var. *indica*
2. 叶片卵形, 两面被绒毛 .....
  - ..... 1b. 毛使君子(变种) *Q. indica* Linn. var. *villosa* C. B. Clarke
1. 花序极密, 花红色或淡红色; 萼管长不超过 2.5 厘米; 花瓣长约 5 毫米; 叶柄短, 有关节 .....
  - ..... 2. 小花使君子 *Q. caudata* Craib

#### 1. 使君子(嘉祐本草)

*Quisqualis indica* Linn. Sp. Pl. ed. 2, 1: 556. 1762; DC. Prodr. 3: 23. 1828; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 23: 294. 1887; Exell in Sun-yatsenia 1: 89. 1935; 赵爱真, 植物分类学报 7: 238. 1958; O. Lecompte in Aubrev. Fl. Camb. Laos Vietn. 10: 26. 1969; 云南植物志 1: 85. 1977——*Q. sinensis* Lindl. in Bot. Reg. t. 15. 1844——*Q. grandiflora* Miq. in Journ. Bot. Neerl. 1: 119. 1861.

1a. 使君子(原变种) 苜求子(南方草木状), 史君子, 四君子(新本草纲目) 图版 3: 8—9

#### var. *indica*

攀援状灌木, 高 2—8 米; 小枝被棕黄色短柔毛。叶对生或近对生, 叶片膜质, 卵形或椭圆形, 长 5—11 厘米, 宽 2.5—5.5 厘米, 先端短渐尖, 基部钝圆, 表面无毛, 背面有时疏被棕色柔毛, 侧脉 7 或 8 对; 叶柄长 5—8 毫米, 无关节, 幼时密生锈色柔毛。顶生穗状花序, 组成伞房花序式; 苞片卵形至线状披针形, 被毛; 萼管长 5—9 厘米, 被黄色柔毛, 先端具广展、外弯、小形的萼齿 5 枚; 花瓣 5, 长 1.8—2.4 厘米, 宽 4—10 毫米, 先端钝圆, 初为白色, 后转淡红色; 雄蕊 10, 不突出冠外, 外轮着生于花冠基部, 内轮着生于萼管中部, 花药长约 1.5 毫米; 子房下位, 胚珠 3 颗。果卵形, 短尖, 长 2.7—4 厘米, 径 1.2—2.3 厘米, 无