

形,长5—7毫米,宽4—6毫米。花期5—6月。

产广东海南岛、广西。在海南岛雨林中常见。分布于越南。

60. 锡兰蒲桃 图版 27: 1

Syzygium zeylanicum (Linn.) DC. Prodr. 3: 260. 1828; Merr. et Perry in Journ. Arn. Arb. 19: 101, 224. 1938——*Myrtus zeylanica* Linn. Sp. Pl. 471. 1753——*Eugenia zeylanica* Wight Ill. 2: 15. 1841; Duthie in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 485. 1878; Gagnep. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 804. 1920; Merr. Enum. Born. Pl. 434. 1921; Ridley Fl. Mal. Penin. 2: 738. 1922, non Willd.——*S. bracteatum* Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. 1: 205. 1847——*E. varians* Miq. Anal. Bot. Ind. 1: 21. 1850——*E. myrtifolia* auct. non Roxb.; Miq., l. c. 20——*S. myrtifolium* Miq. Fl. Ind. Bat. 1(1): 456. 1855——*Jambosa bracteata* Miq., op. cit. 437——*E. antiseptica* auct. non O. Ktze.; Ridley in Journ. Bot. 68: 17. 1930.

乔木;嫩枝圆形,干后黄褐色,老枝灰褐色。叶片薄革质,长卵形或卵状长圆形,长8—10.5厘米,宽3—4.5厘米,先端渐尖或尾状渐尖,尾部长1—1.5厘米,基部近圆形或钝,上面干后橄榄色,发亮,下面黄褐色,侧脉多而密,以 80° — 85° 开角斜向边缘,侧脉间相隔2—3毫米,在上面明显,在下面微突起,贴近边缘1毫米处结合成边脉;叶柄长4—7毫米。圆锥花序顶生及近顶生,长2—3厘米,花序轴纤细;花梗长约2毫米;花蕾棒状,长约7毫米;萼管长5—6毫米,萼齿4—5,肾圆形,长1毫米;花瓣分离,倒卵圆形,长3—4毫米;雄蕊长于花瓣。果实球形,宽7毫米,白色。花期4—5月。

产广东西部及广西钦州。分布于中南半岛、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、印度等地。

61. 黑长叶蒲桃


Syzygium melanophyllum Chang et Miao in Act. Bot. Yunnan. 4(1): 22. 1982.

乔木,高16米;嫩枝圆形,干后黑褐色。叶片狭长圆形或披针形,长14—20厘米,宽4—5.5厘米,先端渐尖,尖头略钝,基部楔形,上面干后黑色,发亮,常有瘤状突起,使叶面变为粗糙,有时平滑,下面黑褐色,侧脉23—32对,在上下两面均明显突起,以 55° 开角斜行向上,靠近边缘1.5—2毫米处相结合成边脉,外侧另有1条小边脉,侧脉间相隔4—6毫米,有明显网脉;叶柄长1—2厘米。果序顶生,长约7厘米,总梗长1—1.5厘米,果梗长6—8毫米;果实球形,直径2厘米(未成熟),有白粉,果皮厚,肉质。果期4—5月。

产云南西双版纳。

这个种近似黑叶蒲桃 *S. thumra* (Roxb.) Merr. et Perry, 但叶片狭长圆形,长14—20厘米,果实较大,直径2厘米,白色,果皮厚。

62. 短序蒲桃 图版 26: 3—4



1. 锡兰蒲桃 *Syzygium zeylanicum* (Linn.) DC.: 果枝(幼果)。2. 万宁蒲桃 *S. howii* Merr. et Perry: 果枝。3. 台湾蒲桃 *S. formosanum* (Hayata) Mori: 花枝。(邓焜发绘)