

产云南、四川(西南部)。生于海拔 550—2700 米的山坡矮草地和路旁矮草坡阳处。尼泊尔、印度至越南也有。

本变种叶通常较金锦香为宽,故取名宽叶金锦香,看来与拉丁名的字意相反,但与实物情况是一致的。

2. 头序金锦香(云南植物志)

Osbeckia capitata Benth. in Wall. Cat. no. 4072. 1829, nom. nud.; Naud. in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 14: 68. 1850, descr.; Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 53. t. 4, fig. 37e. 1871; Guillaum. in Lecte. Not. Syst. 2: 311. 1913; 云南植物志 2: 80. 1979.; C. Chen in Guihaia 2(4): 183. fig. 1, 7—9. 1982

直立草本或亚灌木,高 8—25 厘米;茎四棱形,被疏紧贴的糙伏毛,从基部分枝。叶片坚纸质,卵形,顶端急尖,基部圆形或近心形,长 1.7—2.5 厘米,宽 0.9—1.3 厘米,全缘,两面被糙伏毛,5 基出脉,叶面叶脉下凹,背面隆起,细脉不明显;叶柄几无,被糙伏毛。头状花序,顶生,有花 2—3 朵,基部具叶状总苞 2—4 枚;苞片卵形,具刺毛状缘毛,两面无毛或仅背面中肋被疏糙伏毛;无花梗;花萼长 1.5 厘米,通常带红色,无毛,裂片 4,卵形,与萼管等长,具缘毛,仅各裂片间外缘具 1 有刺毛突起,通常随萼片脱落;花瓣紫红色或较浅,倒卵形,长约 1.5 厘米;雄蕊常偏向 1 侧,花丝与花药等长,花药黄色,顶部具长喙,喙长为花药之半,药隔向前方呈小瘤,向后方微膨大呈短距;子房卵形,顶端有刚毛 16—20 条。蒴果卵形,4 纵裂;宿存萼坛状,顶端平截,直径约 7 毫米,无毛。花果期 6—9 月。

产云南。生于海拔约 2500 米的山坡矮草地上。不丹、印度也有。

本种与金锦香 *O. chinensis* Linn. var. *chinensis* 相近,但以叶卵形,叶面叶脉下凹,花序少花,花萼无毛及分布于大理等地,可以区别。

组 2. 长喙组——Sect. *Ceramicalyx* Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 53. 1871; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 516. 1879; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 322. 1891.; C. Chen in Guihaia 2(4): 183. 1982

花 4 数,萼管长坛形,通常具多轮刺毛状的有柄星状毛;花药长,具长喙,喙长为花药的 3/5;子房顶端通常具 1 圈短刚毛,其余被糙伏毛,稀几无毛。

3. 假朝天罐 盅盅花、痢疾罐(贵州),罐罐花、茶罐花、张天师、小尾光叶、九果根(云南),阿不答石(云南河口瑶族语音),朝天罐(中国高等植物图鉴) 图版 35: 1—4

Osbeckia crinita Benth. in Wall. Cat. no. 4066. 1829, nom. nud.; Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 53. t. 4, fig. 37b. 1871; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 517. 1879, descr.; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 323. 1891; Pritzl in Engl. Bot. Jahrb. 29: 484. 1900; Dunn et Tutchter in Kew Bull. Add. ser. 10: 106. 1912; Guillaum. in Lecte. Not. Syst. 2: 308. 1913 et Bull. Soc.