

产云南、西藏。生于海拔780—1600米的山坡、阳处、田沟边或路边疏林下。尼泊尔也有。

12. 海南金锦香(海南植物志)

Osbeckia hainanensis Masam. in Trans. Nat. Hist. Soc. Taiwan 33: 253. 1943, sphalm. "Kainantensis"; 海南植物志 2: 25. 1965.; C. Chen in Guihaia 2(4): 188. fig. 1, 18. 1982

灌木, 高约1米; 茎四棱形, 密被糙伏毛, 分枝多。叶片坚纸质, 长圆状披针形, 顶端渐尖, 基部微心形或圆形, 长5—8厘米, 宽1.5—2.1厘米, 全缘, 具缘毛, 两面密被糙伏毛, 5基出脉, 叶面基出脉微凹, 侧脉不明显, 背面基出脉隆起, 侧脉微隆起; 叶柄极短, 长约1毫米, 密被糙伏毛。由聚伞花序组成的头状花序, 生于小枝顶端, 苞片叶状, 小苞片膜质, 卵形, 长7—9毫米, 宽约5毫米, 具缘毛, 仅外面脊上具糙伏毛; 花梗短或几无; 花萼管长约6.5毫米, 具有柄筒状刺毛突起, 裂片5, 长卵形, 顶端渐尖, 两面无毛, 被缘毛, 长约8毫米, 各裂片间具有柄筒状刺毛突起1枚; 花瓣5, 粉红色, 倒卵形, 斜偏, 顶端圆形, 长约1.5厘米, 宽1.3厘米, 上半部具缘毛; 雄蕊10, 常偏向1侧, 长约14毫米, 花药长约7毫米, 具短喙, 药隔基部微膨大, 呈盘状, 有短距; 子房卵状球形, 5室, 顶端具几束短刚毛, 心皮合生处具疏刺毛。果未详。 花期10—12月。

产广东(仅海南岛)。生于海拔约1000米的河岸两旁。模式标本采自海南岛的崖县与乐东之间的地方。

2. 耳药花属——*Otanthera* Blume

Blume in Flora 488. 1831 et Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 55. 1849;
Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 746. 1867; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 339. 1891; Krass. in Engl. u. Plantl Nat. Pflanzenfam. 3(7): 153. 1893; H. Keng in Quart. Journ. Taiwan Mus. 8: 32. 1955; H. Keng et H. L. Li in Fl. Taiwan 3: 861. 1977
——*Lachnopus* Blume Mus. Bot. Lugd.-Bat. 1: 56. 1849.

灌木, 小枝通常圆柱形, 被毛。叶片坚纸质或近革质, 两面通常被毛, 全缘, 3—5基出脉; 具叶柄, 常被毛。花5(—6)数, 聚伞花序或单花, 顶生或近顶生; 萼管卵圆形, 通常具带胶质的鳞片或毛, 或近无毛, 裂片卵形或卵状披针形; 花瓣通常倒卵形, 雄蕊10枚, 稀更多, 近等长, 同形; 花药披针形或卵状披针形, 顶孔开裂, 无喙, 基部具小疣, 药隔下延呈短距; 花丝丝状; 子房卵形, 半下位, 顶端常具硬毛, 5—6室, 花柱丝状, 柱头点尖。浆果坛形, 与宿存萼贴生, 同形; 宿存萼被毛; 种子马蹄形, 密布小突起。

约8种, 分布于印度、缅甸、马来西亚、菲律宾及澳大利亚北部。我国1种, 产台湾。