

毛,其余被疏微柔毛。

产广东(仅海南岛)。生于海拔100—450米的山坡疏、密林中,阳处或阴处灌丛中。模式标本采自广东海南岛东方县。

2. 尖子木族——Trib. Oxysporae Triana

Triana in Bull. Congr. Amsterd. 457. 1865 et Trans. Linn. Soc. 28: 7. 1871; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 731. 1867; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 461. 1891——*Rhexiae* DC. Prodr. 3: 114. 1828——*Miconieae* DC. l. c. 152, p. p.

子房无毛或被腺点,顶端具小突起、小齿或无膜质冠,种子不弯曲,通常为楔形,具棱;蒴果短于宿存萼,宿存萼近顶端常缢缩,有时具钝棱。

约15属,主要分布于马达加斯加、印度、我国及东南亚热带及亚热带地区。我国有7属,分布于西藏至江西以南各省区。

4. 长穗花属——*Styrophyton* S. Y. Hu

S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 174. 1952; 侯宽昭, 中国种

子植物科属辞典 420. 1958; 云南植物志 2: 96. 1979.

灌木,直立,茎圆柱形,被毛。叶片卵形或广卵形,全缘,被毛,具缘毛,5基出脉,侧脉多数,互相平行,细脉网状;具叶柄。长穗状花序顶生,轴细长,无苞片;花小,4数,1或3—5朵1簇,无花梗;花萼钟形,具8脉,其中4脉较明显,被毛,裂片扁三角形或钝三角形,极小,整齐;花瓣粉红色或白色,倒卵形或广倒卵形,顶端钝,内凹,略偏斜;雄蕊为花瓣的1倍,近等长,同形,无附属体,花药披针形,顶端平截,单孔开裂,药隔微膨大,基部无距;子房半下位,卵状球形,4室,顶端平截,裂片不明显;花柱丝状,柱头点尖。蒴果卵状球形,顶端平截,冠以1圈刚毛,与宿存萼贴生;宿存萼与蒴果同形,具明显的8脉,被毛;种子多数,极小,楔形,具棱,被糠秕。

1种,为我国特有,分布于云南、广西。

1. 长穗花(云南植物志) 假欧八竹(云南哈尼族语) 图版37: 7—12

Styrophyton caudatum (Diels) S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 176. 1952; 云南植物志 2: 96. 图版25, 7—12. 1979——*Anerincleistus? caudatus* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 101. 1932——*Allomorphia caudata* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 11. 1944——*Oxyspora spicata* Maxw. in Gard. Bull. Sing. 35(2): 218. 1982, syn. nov.

灌木,高1—2(—5?)米;茎圆柱形,密被锈色长柔毛。叶片纸质或坚纸质,卵形或广卵形,顶端短渐尖或急尖,基部圆形或浅心形,长10—21(—26)厘米,宽6—13(—16)厘米,全缘,密被锈色缘毛,5基出脉,叶面幼时密被糙伏毛,以后脱落而粗糙,基出脉微凹,

毛更密,侧脉及细脉下凹,不甚明显,背面密被长柔毛,基出脉、侧脉及细脉均隆起;叶柄长1.5—5(—5.5)厘米,密被锈色长柔毛。穗状花序顶生,密被长柔毛,长13—20(—26)厘米;花小,1或3—5朵簇生,无柄;花萼长2—2.5毫米,钟形,密被刚毛,裂片扁三角形或钝三角形,极小,长约0.5毫米,里面无毛;花瓣粉红色或白色,倒卵形或广倒卵形,略具爪,顶端钝,内凹,或具1—2小齿,外面常被糠秕,略偏斜,长约1.5毫米;雄蕊浅紫色,长约3毫米,花丝与花药等长;子房顶部被糠秕,其余糠秕疏或几无。蒴果卵状球形,顶端平截,长2—2.5毫米,直径约2毫米;宿存萼密被刚毛,具明显的纵肋8条。花期5—6月,果期10月至翌年1月。

产云南、广西。生于海拔400—1500米的山谷密林中,荫湿的地方或沟边等灌木丛中。模式标本采自云南蒙自。

根可入药,配伍治子宫脱垂、脱肛。

J. F. Maxwell 将本种并入尖子木属 *Oxyspora* DC. 看来是不适当的,因为该属的雄蕊是4长4短,药隔基部伸长成短距;花序为聚伞花序组成的圆锥花序,与本种区别甚大。

5. 异形木属——*Allomorpha* Blume

Blume in *Flora* 2: 522. 1831; Benth. et Hook. f. *Gen. Pl.* 1:


752. 1862; Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* 7: 463. 1891; 侯宽昭,

中国种子植物科属辞典 17. 1958; 云南植物志 2: 92. 1979.

灌木或多年生草本,基部木质化,直立;茎圆柱形或四棱形,棱上有翅或无,通常被毛,常分枝。叶片全缘或具密细齿,3—7条基出脉,侧脉平行;具长叶柄。由多个聚伞花序组成的狭圆锥花序,长可达25厘米以上,宽3—4厘米;苞片小,常早落;花4—5数,小,花萼狭漏斗形或漏斗状钟形,四棱形,通常中部缢缩,具8脉,其中4条不甚明显,裂片极短,宽或不甚明显,顶端具小尖头;花瓣粉红色至紫红色,卵形或广卵形或广倒卵形,上部偏斜,顶端短急尖或点尖;雄蕊为花瓣数目的1倍,近等长,花时常偏向1侧,花丝与花瓣等长或略长,花药与花丝等长或略长,钻形或长圆状线形,单孔开裂,基部无附属物,药隔基部微膨大,不成距或呈短距;子房下位,卵形或卵状球形,高仅有萼长的1/3或1/2,4—5室,顶端有8—10条刚毛或小齿,通常无隔片;花柱细长,长通常超过雄蕊。蒴果卵形、椭圆形或近球形,与宿存萼贴生;宿存萼较蒴果长,有8条明显的纵肋,常由纵肋处裂开;种子多数,极小,楔形,有棱,被微柔毛。

约25种,分布于印度、我国南部、马来西亚至印度尼西亚等地;我国6种,产云南、广西、广东等省区南部。

J. F. Maxwell (in *Gard. Bull. Sing.* 35(2): 209. 1982) 将本属的报大多数的



1. 翅茎异形木 *Allomorpha eupheteron* Guillaum. var. *teretipetiolata* C. Y. Wu et C. Chen
花枝。2—6. 刚毛尖子木 *Oxytropis vagans* (Roxb.) Wall.: 2. 叶背面, 3. 花, 4. 花萼纵剖, 示
子房及花柱, 5. 雄蕊, 6. 花瓣 (右上角具1小片)。7—12. 长穗花 *Styrophyton caudatum*
(Diels) S. Y. Hu: 7. 花枝, 8. 花, 9. 雄蕊, 10. 花萼纵剖, 示子房及花柱, 11—12. 花瓣。(肖溶绘)