

毛,其余被疏微柔毛。

产广东(仅海南岛)。生于海拔100—450米的山坡疏、密林中,阳处或阴处灌丛中。模式标本采自广东海南岛东方县。

2. 尖子木族——Trib. Oxysporae Triana

Triana in Bull. Congr. Amsterd. 457. 1865 et Trans. Linn. Soc. 28: 7. 1871; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 731. 1867; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 461. 1891——*Rhexiae* DC. Prodr. 3: 114. 1828——*Miconieae* DC. l. c. 152, p. p.

子房无毛或被腺点,顶端具小突起、小齿或无膜质冠,种子不弯曲,通常为楔形,具棱;蒴果短于宿存萼,宿存萼近顶端常缢缩,有时具钝棱。

约15属,主要分布于马达加斯加、印度、我国及东南亚热带及亚热带地区。我国有7属,分布于西藏至江西以南各省区。

4. 长穗花属——*Styrophyton* S. Y. Hu

S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 174. 1952; 侯宽昭, 中国种

子植物科属辞典 420. 1958; 云南植物志 2: 96. 1979.

灌木,直立,茎圆柱形,被毛。叶片卵形或广卵形,全缘,被毛,具缘毛,5基出脉,侧脉多数,互相平行,细脉网状;具叶柄。长穗状花序顶生,轴细长,无苞片;花小,4数,1或3—5朵1簇,无花梗;花萼钟形,具8脉,其中4脉较明显,被毛,裂片扁三角形或钝三角形,极小,整齐;花瓣粉红色或白色,倒卵形或广倒卵形,顶端钝,内凹,略偏斜;雄蕊为花瓣的1倍,近等长,同形,无附属体,花药披针形,顶端平截,单孔开裂,药隔微膨大,基部无距;子房半下位,卵状球形,4室,顶端平截,裂片不明显;花柱丝状,柱头点尖。蒴果卵状球形,顶端平截,冠以1圈刚毛,与宿存萼贴生;宿存萼与蒴果同形,具明显的8脉,被毛;种子多数,极小,楔形,具棱,被糠秕。

1种,为我国特有,分布于云南、广西。

1. 长穗花(云南植物志) 假欧八竹(云南哈尼族语) 图版37: 7—12

Styrophyton caudatum (Diels) S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 176. 1952; 云南植物志 2: 96. 图版25, 7—12. 1979——*Anerincleistus?* *caudatus* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 101. 1932——*Allomorpha caudata* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 11. 1944——*Oxyspora spicata* Maxw. in Gard. Bull. Sing. 35(2): 218. 1982, syn. nov.

灌木,高1—2(—5?)米;茎圆柱形,密被锈色长柔毛。叶片纸质或坚纸质,卵形或广卵形,顶端短渐尖或急尖,基部圆形或浅心形,长10—21(—26)厘米,宽6—13(—16)厘米,全缘,密被锈色缘毛,5基出脉,叶面幼时密被糙伏毛,以后脱落而粗糙,基出脉微凹,