

毛更密,侧脉及细脉下凹,不甚明显,背面密被长柔毛,基出脉、侧脉及细脉均隆起;叶柄长1.5—5(—5.5)厘米,密被锈色长柔毛。穗状花序顶生,密被长柔毛,长13—20(—26)厘米;花小,1或3—5朵簇生,无柄;花萼长2—2.5毫米,钟形,密被刚毛,裂片扁三角形或钝三角形,极小,长约0.5毫米,里面无毛;花瓣粉红色或白色,倒卵形或广倒卵形,略具爪,顶端钝,内凹,或具1—2小齿,外面常被糠秕,略偏斜,长约1.5毫米;雄蕊浅紫色,长约3毫米,花丝与花药等长;子房顶部被糠秕,其余糠秕疏或几无。蒴果卵状球形,顶端平截,长2—2.5毫米,直径约2毫米;宿存萼密被刚毛,具明显的纵肋8条。花期5—6月,果期10月至翌年1月。

产云南、广西。生于海拔400—1500米的山谷密林中,荫湿的地方或沟边等灌木丛中。模式标本采自云南蒙自。

根可入药,配伍治子宫脱垂、脱肛。

J. F. Maxwell 将本种并入尖子木属 *Oxyspora* DC. 看来是不适当的,因为该属的雄蕊是4长4短,药隔基部伸长成短距;花序为聚伞花序组成的圆锥花序,与本种区别甚大。

5. 异形木属——*Allomorpha* Blume

Blume in *Flora* 2: 522. 1831; Benth. et Hook. f. *Gen. Pl.* 1:

752. 1862; Cogn. in DC. *Monogr. Phan.* 7: 463. 1891; 侯宽昭,

中国种子植物科属辞典 17. 1958; 云南植物志 2: 92. 1979.

灌木或多年生草本,基部木质化,直立;茎圆柱形或四棱形,棱上有翅或无,通常被毛,常分枝。叶片全缘或具密细齿,3—7条基出脉,侧脉平行;具长叶柄。由多个聚伞花序组成的狭圆锥花序,长可达25厘米以上,宽3—4厘米;苞片小,常早落;花4—5数,小,花萼狭漏斗形或漏斗状钟形,四棱形,通常中部缢缩,具8脉,其中4条不甚明显,裂片极短,宽或不甚明显,顶端具小尖头;花瓣粉红色至紫红色,卵形或广卵形或广倒卵形,上部偏斜,顶端短急尖或点尖;雄蕊为花瓣数目的1倍,近等长,花时常偏向1侧,花丝与花瓣等长或略长,花药与花丝等长或略长,钻形或长圆状线形,单孔开裂,基部无附属物,药隔基部微膨大,不成距或呈短距;子房下位,卵形或卵状球形,高仅有萼长的1/3或1/2,4—5室,顶端有8—10条刚毛或小齿,通常无隔片;花柱细长,长通常超过雄蕊。蒴果卵形、椭圆形或近球形,与宿存萼贴生;宿存萼较蒴果长,有8条明显的纵肋,常由纵肋处裂开;种子多数,极小,楔形,有棱,被微柔毛。

约25种,分布于印度、我国南部、马来西亚至印度尼西亚等地;我国6种,产云南、广西、广东等省区南部。

J. F. Maxwell (in *Gard. Bull. Sing.* 35(2): 209. 1982) 将本属的报大多数的

种类并入雄蕊不等长的尖子木属 *Oxyspora* DC., 但未说明原因, 故在此未作变动。

分 种 检 索 表

1. 小枝四棱形, 棱上有狭翅
..... 1. **翅茎异形木** *A. eupteroton* Guillaum. var. *teretipetiolata* C. Y. Wu et C. Chen
1. 小枝钝四棱形或圆柱形, 无翅。
2. 叶背被锈色糠秕; 幼枝被糠秕或除糠秕外尚被柔毛。
3. 幼枝及叶柄被糠秕及柔毛; 叶背基出脉及侧脉通常具瘤状横纹; 花瓣广倒卵形, 上部偏斜, 长约 3 毫米 2. **尾叶异形木** *A. urophylla* Diels
3. 幼枝及叶柄仅被糠秕; 叶背基出脉及侧脉仅被糠秕, 无瘤状横纹; 花瓣广卵形或卵形, 长约 2 毫米
..... 3. **异形木** *A. balansae* Cogn.
2. 叶背脉上被绒毛状刺毛或长柔毛或平展的刺毛; 幼枝除糠秕外尚有绒毛状短刺毛、长柔毛及刺毛等。
4. 雄蕊药隔微膨大, 无距; 子房顶端具 8 小齿; 茎密被平展的锈色绒毛状短刺毛, 毛基部略膨大
..... 4. **越南异形木** *A. baviensis* Guillaum.
4. 雄蕊药隔膨大, 基部下延成短距; 子房顶端具 8 条刺毛; 茎密被平展的紫红色刺毛及微柔毛或幼时密被糠秕及长柔毛。
5. 叶面无毛或幼时被细糠秕, 背面密被糠秕及有时基出脉被长柔毛; 叶柄两侧被密长柔毛
..... 5. **腾冲异形木** *A. howellii* (J. F. Jeff. et W. W. Smith) Diels
5. 叶面被极疏的糙伏毛或无毛, 背面密被平展的刺毛及微柔毛; 叶柄密被平展刺毛及微柔毛
..... 6. **刺毛异形木** *A. setosa* Craib

1. 翅茎异形木 图版 37: 1

Allomorpha eupteroton Guillaum. var. *teretipetiolata* C. Y. Wu et C. Chen, 云南植物志 2: 93. 图版 25, 1. 1979.

灌木, 高约 1.7 米; 茎四棱形, 棱上有狭翅, 无毛或幼时密被糠秕, 分枝多。叶片坚纸质, 卵形或椭圆状卵形, 顶端渐尖, 基部钝至微心形, 长 12—18.5 厘米, 宽 5.5—8.5 厘米, 边缘具密细齿或几全缘, 5 基出脉, 叶面无毛或仅基出脉上被糠秕, 基出脉微凹, 侧脉微凸, 背面仅脉上被糠秕, 基出脉、侧脉隆起, 糠秕脱落后常成瘤状横纹; 叶柄长 1.5—4 厘米, 密被糠秕, 具槽, 槽两侧多少具髯毛。花未见; 果序为由聚伞花序组成的狭圆锥状果序, 长 18—25 厘米, 宽约 4 厘米, 轴及小伞梗四棱形, 棱上有狭翅, 被糠秕, 每个聚伞果序长 1.5—2.5 厘米。蒴果卵状球形, 长约 3.5—4 毫米, 直径约 4 毫米, 为宿存萼所包; 宿存萼棕色, 长约 5 毫米, 萼片宽三角形, 有时多少被糠秕, 具 8 条明显的纵肋。花期未详, 果期约 4 月。

产云南南部。生于海拔约 700 米的山坡阳处, 灌木丛中。模式标本采自云南金屏。

本变种与产于越南和老挝的原变种 *Allomorpha eupteroton* Guillaum. var. *eupteroton* 的主要区别是, 本变种叶背脉上、小枝及果序均被糠秕, 叶柄无翅。