

2. 尾叶异形木

Allomorpha urophylla Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 102. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 10. 1944; S. Y. Hu l. c. 33: 166. 1952; 云南植物志 2: 94. 1979.

灌木, 高 1—2 米; 茎圆柱形, 幼时密被锈色糠秕及柔毛, 很快即脱落, 皮黑色, 以后呈灰褐色, 分枝多, 节上常膨大。叶片纸质, 椭圆形至披针状椭圆形, 顶端长渐尖或近尾状渐尖, 基部楔形或宽楔形, 长 7—14 厘米, 宽 3—5.5 厘米, 稀长达 18 厘米, 宽 7 厘米, 全缘或略具细密齿, 3—5 基出脉, 叶面几无毛或被锈色疏糠秕(常很快脱落), 基出脉微凹, 背面多少被锈色糠秕, 以脉上为多, 基出脉、侧脉隆起, 常具瘤状横纹, 细脉不明显; 柄叶长 1—2 厘米, 幼时密被锈色糠秕及柔毛, 以后渐脱落, 但槽内柔毛保存较久。由聚伞花序组成的狭圆锥花序, 生于分枝顶端, 长 9—16 厘米, 宽 2—3 厘米, 密被糠秕及疏柔毛或稀几无毛, 每个小聚伞花序总梗长 2—6(—10) 毫米, 花梗长约 1 毫米; 花萼长约 5 毫米, 多少具疏糠秕, 裂片 4, 小, 三角形, 长不到 1 毫米; 花瓣 4, 红色、粉红色或紫红色, 广倒卵形, 上部偏斜, 长约 3 毫米; 雄蕊 8, 常偏向 1 侧, 花丝与花药近等长, 药隔基部微膨大, 无距; 子房下位, 卵形, 4 室, 顶端有 8 枚小齿。蒴果椭圆形或近卵形, 长约 4 毫米, 直径 3 毫米; 宿存萼较果长, 有时带紫红色, 多少被糠秕或几无, 长约 5 毫米, 萼片三角形, 有 8 条明显的纵肋。花期 7—9(—10) 月, 果期 11—12 月至翌年 1 月。

产云南东南部、广西西部及大苗山。生于海拔 500—1700(—2000) 米的密林下, 湿润的地方。模式标本采自云南蒙自。

广西的标本叶通常较大, 叶片长达 20 厘米, 宽 8.5 厘米, 叶柄长达 4 厘米。

J. F. Maxwell 将本种并入 *Oxyspora balansae* (Cogn.) Maxw., 按实物是很好区别的, 故仍作种处理。

3. 异形木 肖风木(广西)

Allomorpha balansae Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 1183. 1891 (sphalm. ut “balansaei”); Guillaum. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 901. 1921; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 102. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 10. 1944; 海南植物志 2: 29. 图 302. 1965.

灌木, 高 1—3 米; 茎幼时四棱形, 密被锈色糠秕, 以后圆柱形, 糠秕脱落, 皮黑色, 分枝多, 节略膨大。叶片坚纸质或纸质, 卵形、宽卵形或椭圆形, 稀披针形, 顶端渐尖至尾状渐尖, 基部圆形或宽楔形, 长 6.5—19 厘米, 宽 2.5—9 厘米, 通常长约 12 厘米, 宽 5.5 厘米, 近全缘或具极微的疏细齿, 基出脉 5 条, 最外侧的近边缘, 叶面无毛或幼时被疏糠秕, 基出脉平整, 背面以脉上糠秕较多, 脉隆起; 叶柄长 1—4.5 厘米, 通常为 2.5 厘米, 密被糠秕。由聚伞花序组成狭圆锥花序, 生于分枝顶端, 长 7—11 厘米, 宽 2—3 厘米, 密被糠秕, 每个小聚伞花序总梗长 4—7 毫米, 花梗长约 2 毫米; 花萼狭漏斗形, 被糠秕, 管长约 5 毫