

产云南(思茅以南至东南部)。生于海拔 500—1200 米的密林下,潮湿的地方。泰国也有。

J. F. Maxwell 将本种作 *Oxyspora balansae* (Cogn.) Maxw. var. *setosa* (Craib) Maxw. (1982)。

6. 尖子木属——*Oxyspora* DC.

DC. Prodr. 3: 123. 1828; Benth. et Hook. Gen. Pl. 1: 751. 1862;

Cogn. in DC. Monogr. Plan. 7: 470. 1891; 侯宽昭, 中国种子植

物科属辞典 308. 1958; 云南植物志 2: 96. 1979; Maxw. in Gard.

Bull. Sing. 35(2): 216. 1982, p. p

灌木, 茎钝四棱形, 具槽。单叶对生, 边缘具细齿, 5—7 基出脉; 具叶柄。由聚伞花序组成的圆锥花序, 顶生; 苞片极小, 常早落; 花 4 数, 花萼狭漏斗形, 具 8 脉, 萼片短, 宽三角形或扁三角状卵形, 顶端常具小尖头; 花瓣粉红色至红色, 或深玫瑰色, 卵形, 顶端通常具突起小尖头并被微柔毛; 雄蕊 8, 4 长 4 短, 长者药隔不伸长或伸长成短距(我国不产), 短者通常内藏, 药隔基部伸长成短距; 子房通常为椭圆形, 4 室, 顶端无冠。蒴果倒卵形或卵形, 有时呈钝四棱, 顶端伸出胎座轴, 4 孔裂; 宿存萼较果略长, 通常漏斗形, 近上部常缢缩, 具纵肋 8 条; 种子多数, 近三角状披针形, 有棱。

约 20 种, 产我国西南部、尼泊尔、缅甸、印度、越南、老挝、泰国等。我国有 3 种, 分布于西藏、四川至广西。

本属有的植物供药用。

分 种 检 索 表

1. 幼枝被糠秕状星状毛及具微柔毛的疏刚毛*; 大圆锥花序, 宽约 10 厘米或更宽; 叶面被糠秕状鳞片或几无, 背面仅沿脉被糠秕状星状毛…………… 1. 尖子木 *O. paniculata* (D. Don) DC.
1. 幼枝被平展的刚毛或无毛; 圆锥花序狭, 宽达 7 厘米; 叶面、叶背非上述毛被。
 2. 叶片披针状长圆形至长圆状卵形, 宽 2.5—4.2 厘米, 基部楔形或近圆形, 有时略偏斜, 叶面被基部膨大的细微柔毛, 背面无毛; 长雄蕊花药基部深 2 裂, 药隔不下延, 无距或呈极短的距…………… 2. 滇尖子木 *O. yunnanensis* H. L. Li
 2. 叶片卵形或椭圆形, 宽 5—7.5 厘米, 基部浅心形至圆形或钝, 两面被细小的糠秕状鳞片, 叶背幼时沿基出脉密被刚毛; 长雄蕊花药基部浅 2 裂, 药隔下延, 呈较长的距…………… 3. 刚毛尖子木 *O. vagans* (Roxb.) Wall.

1. 尖子木(陈嵘, 中国树木分类学) 酒瓶果、砚山红(云南), 牙娥拔翠(云南河口傜族语)

* 刚毛上被微柔毛。

Oxyspora paniculata (D. Don) DC. Prodr. 3: 123. 1828 et Mém. Melast. 33: t. 4. 1828; Wall. Pl. As. Rar. 1: 78. t. 88. 1830; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 471. 1891; Guillaum. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 907. 1921; Lév. Cat. Pl. Yan-Nan 176. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 110. 1934; Chun in Sunyatsenia 4: 192. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 12. 1944; S. Y. Hu l. c. 33: 170. pl. 2, fig. 4. 1952; Hara Fl. East. Himal. 2: 89. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 1004. 图 3738. 1972; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 400. 1972; 云南植物志 2: 98. 1979——*Arthrostemma paniculatum* D. Don in Mém. Wern. Soc. 4: 299. 1823 et Prodr. Fl. Nepal. 222. 1825——*Oxyspora vagans* auct. non (Roxb.) Wall.; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 76: t. 4553. 1850——*Bredia soneriloides* Lév. in Repert. Sp. Nov. 9: 21. 1910——*Sonerila cavaleriei* Lév. l. c., pro syn. *Bredia soneriloides* et l. c., 11: 494. 1913.

灌木, 高 1—2 米, 稀达 6 米; 茎四棱形或钝四棱形, 通常具槽, 幼时被糠秕状星状毛及具微柔毛的疏刚毛。叶片坚纸质, 卵形或狭椭圆状卵形或近椭圆形, 顶端渐尖, 基部圆形或浅心形, 长 12—24 厘米, 宽 4.6—11 厘米, 稀长 32 厘米, 宽 15.5 厘米, 边缘具不整齐小齿, 7 基出脉, 叶面被糠秕状鳞片或几无, 基出脉下凹, 背面通常仅于脉上被糠秕状星状毛, 脉明显, 隆起, 细脉与侧脉垂直; 叶柄长 1—7.5 厘米, 有槽, 通常密被糠秕状星状毛, 槽内被具微柔毛的刚毛。由聚伞花序组成的圆锥花序, 顶生, 被糠秕状星状毛, 长 20—30 厘米, 稀较短, 基部具叶状总苞 2; 苞片和小苞片小, 披针形或钻形, 长 1—3 毫米; 花萼长约 8 毫米, 幼时密被星状毛, 以后渐脱落, 狭漏斗形, 具钝四棱, 有纵脉 8 条, 裂片扁三角状卵形, 长约 1 毫米, 顶端急尖, 具突起的小尖头; 花瓣红色至粉红色, 或深玫瑰红色, 卵形, 长约 7 毫米, 于右上角突出 1 小片, 顶端具突起的小尖头并被微柔毛; 雄蕊长者紫色, 药隔隆起而不伸长, 短者黄色, 药隔隆起, 基部伸长成短距; 子房下位, 无毛。蒴果倒卵形, 顶端具胎座轴, 长约 8 毫米, 直径约 6 毫米; 宿存萼较果长, 漏斗形。花期 7—9 月, 稀 10 月, 果期 1—3 月, 稀达 5 月。

产西藏、贵州、云南、广西。生于海拔 500—1900 米的山谷密林下, 荫湿处或溪边, 也生长于山坡疏林下, 灌木丛中湿润的地方。尼泊尔、缅甸至越南也有。

全株清热止痢, 治痢疾、腹泻、疮疖等。

2. 滇尖子木(云南植物志)

Oxyspora yunnanensis H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 12. 1944; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 165: t. 39. 1948; 云南植物志 2: 99. 1978——*O. glabra* H. L. Li l. c. 13——*O. paniculata* (D. Don) DC. var. *yunnanensis* (H. L. Li) Maxw. in Gard. Bull. Sing. 35(2): 217. 1982.

灌木, 高 1—2 米; 茎钝四棱形, 具槽, 幼时被平展的刚毛或脱落变无毛。叶片坚纸质或