

Oxyspora paniculata (D. Don) DC. Prodr. 3: 123. 1828 et Mém. Melast. 33: t. 4. 1828; Wall. Pl. As. Rar. 1: 78. t. 88. 1830; Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 471. 1891; Guillaum. in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 907. 1921; Lév. Cat. Pl. Yan-Nan 176. 1916; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 110. 1934; Chun in Sunyatsenia 4: 192. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 12. 1944; S. Y. Hu l. c. 33: 170. pl. 2, fig. 4. 1952; Hara Fl. East. Himal. 2: 89. 1971; 中国高等植物图鉴 2: 1004. 图 3738. 1972; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 400. 1972; 云南植物志 2: 98. 1979——*Arthrostemma paniculatum* D. Don in Mém. Wern. Soc. 4: 299. 1823 et Prodr. Fl. Nepal. 222. 1825——*Oxyspora vagans* auct. non (Roxb.) Wall.; Hook. in Curtis's Bot. Mag. 76: t. 4553. 1850——*Bredia soneriloides* Lév. in Repert. Sp. Nov. 9: 21. 1910——*Sonerila cavaleriei* Lév. l. c., pro syn. *Bredia soneriloides* et l. c., 11: 494. 1913.

灌木, 高 1—2 米, 稀达 6 米; 茎四棱形或钝四棱形, 通常具槽, 幼时被糠秕状星状毛及具微柔毛的疏刚毛。叶片坚纸质, 卵形或狭椭圆状卵形或近椭圆形, 顶端渐尖, 基部圆形或浅心形, 长 12—24 厘米, 宽 4.6—11 厘米, 稀长 32 厘米, 宽 15.5 厘米, 边缘具不整齐小齿, 7 基出脉, 叶面被糠秕状鳞片或几无, 基出脉下凹, 背面通常仅于脉上被糠秕状星状毛, 脉明显, 隆起, 细脉与侧脉垂直; 叶柄长 1—7.5 厘米, 有槽, 通常密被糠秕状星状毛, 槽内被具微柔毛的刚毛。由聚伞花序组成的圆锥花序, 顶生, 被糠秕状星状毛, 长 20—30 厘米, 稀较短, 基部具叶状总苞 2; 苞片和小苞片小, 披针形或钻形, 长 1—3 毫米; 花萼长约 8 毫米, 幼时密被星状毛, 以后渐脱落, 狭漏斗形, 具钝四棱, 有纵脉 8 条, 裂片扁三角状卵形, 长约 1 毫米, 顶端急尖, 具突起的小尖头; 花瓣红色至粉红色, 或深玫瑰红色, 卵形, 长约 7 毫米, 于右上角突出 1 小片, 顶端具突起的小尖头并被微柔毛; 雄蕊长者紫色, 药隔隆起而不伸长, 短者黄色, 药隔隆起, 基部伸长成短距; 子房下位, 无毛。蒴果倒卵形, 顶端具胎座轴, 长约 8 毫米, 直径约 6 毫米; 宿存萼较果长, 漏斗形。花期 7—9 月, 稀 10 月, 果期 1—3 月, 稀达 5 月。

产西藏、贵州、云南、广西。生于海拔 500—1900 米的山谷密林下, 荫湿处或溪边, 也生长于山坡疏林下, 灌木丛中湿润的地方。尼泊尔、缅甸至越南也有。

全株清热止痢, 治痢疾、腹泻、疮疖等。

2. 滇尖子木(云南植物志)

Oxyspora yunnanensis H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 12. 1944; Sealy in Curtis's Bot. Mag. 165: t. 39. 1948; 云南植物志 2: 99. 1978——*O. glabra* H. L. Li l. c. 13——*O. paniculata* (D. Don) DC. var. *yunnanensis* (H. L. Li) Maxw. in Gard. Bull. Sing. 35(2): 217. 1982.

灌木, 高 1—2 米; 茎钝四棱形, 具槽, 幼时被平展的刚毛或脱落变无毛。叶片坚纸质或

略薄,披针状长圆形至长圆状卵形,顶端渐尖,基部楔形或近圆形,有时略偏斜,长6—13厘米,宽2.5—4.2厘米,边缘具不整齐的小齿,或几全缘,5基出脉,叶面被基部膨大的细微柔毛,幼时较明显,基出脉下凹,侧脉明显但不隆起,背面无毛,基出脉、侧脉明显,隆起;叶柄长5—15毫米,有槽,与叶片连接处和与茎着生处被1簇刚毛。由聚伞花序组成狭圆锥花序,顶生,长10—21厘米,宽达7厘米,被微柔毛或脱落成无毛,基部具1对叶状总苞,通常早落;苞片极小,披针形;花梗长约5毫米,被微柔毛或无毛;花萼长约6毫米,被微柔毛或无毛,狭漏斗形,具钝四棱,裂片宽三角形,长1—1.5毫米,顶端急尖,具突起的小尖头;花瓣玫瑰红色,卵形,长约1厘米,顶端具突起的小尖头,具缘毛;雄蕊长者紫色,药隔基部微伸长,短者黄色,药隔基部伸长或短距;子房卵形,顶端浅4裂,无毛。蒴果卵形,四棱形,顶端伸出胎座轴,长约6毫米,直径约4毫米,顶孔开裂;宿存萼较果略长,漏斗状,颈部缢缩,具纵肋8条。花期约8月,果期10—11月。

产云南西北部。生于海拔1300—2800米的密林下或江边岩石缝中。模式标本采自云南贡山独龙河。

组2. 同距组——Sect. *Homocentria* Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 472. 1891.
长雄蕊花药基部浅2裂,药隔下延,呈较长的距。

3. 刚毛尖子木(云南植物志) 图版37: 2—6

***Oxyspora vagans* (Roxb.) Wall. Cat. no. 4075. 1829 et Pl. As. Rar. 1: 78. 1830; Triana in Trans. Linn. Soc. 28: 73. t. 6, fig. 62c. 1871; Kurz For. Fl. Brit. Burm. 1: 505. 1877, in clavi tantum; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 526. 1879; Craib Fl. Siam. Enum. 1: 685. 1931; 云南植物志 2: 99. 图版25, 2—6. 1979——*Melastoma vagans* Roxb. in Hort. Beng. 33. 1814, nom. nud. et Fl. Ind. ed. Carey 2: 404. 1824, descr.——*Homocentria vagans* Naud. in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 15: 308. t. 15, fig. 4. 1851——*Allomorphia setosa* auct. non Craib; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 11. 1944, p. p. min., quoad C. W. Wang 79796——*O. paniculata* (D. Don) DC. var. *vagans* (Roxb.) Maxw. in Gard. Bull. Sing. 35(2): 217. 1982.**

灌木,高1—2米;茎略四棱形或圆柱形,无槽或稀具浅槽,幼嫩时密被平展的腺毛。叶片薄坚纸质或近膜质,卵形或椭圆形,顶端渐尖,基部浅心形至圆形或钝,长11—16.5(—19)厘米,宽5—7.5(—9)厘米,边缘具不整齐的小齿,齿尖具刚毛,通常具缘毛,5—7基出脉,两面被细小的糠秕状鳞片,叶面基出脉、侧脉平整,背面基出脉、侧脉明显,隆起,幼时基出脉、侧脉密被星状毛;叶柄长1.5—5.5(—6)厘米,幼时被星状毛,以后密被腺毛。由聚伞花序组成的圆锥花序,顶生,长12—25厘米,宽2.5—6厘米,基部具叶状总苞2枚,花序轴、花梗及花萼均密被糠秕状星状毛;苞片和小苞片小,钻形,长约1毫米,早落;花萼长约6毫米,狭坛形,具钝四棱,具纵脉8条,其中4条不明显,裂片极小,几不明