

显,顶端具突起的小尖头;花瓣红色或粉红色,卵形,长约6毫米,于右上角突出1小片,顶端具突起小尖头,无毛;雄蕊长者与短者药隔均隆起,基部均伸长成短距;子房纺锤形,下位,无毛。蒴果椭圆形,顶端具胎座轴,长约5.5毫米,顶孔开裂;宿存萼较果长,坛形,近顶端缢缩。花期约10月,果期约3月。

产云南。生于海拔700—930米的疏、密林中,湿润的地方及溪边、河旁。印度、缅甸、泰国也有。

7. 偏瓣花属——*Plagiopetalum* Rehd.

Rehd. in Sargent Pl. Wils. 3: 452. 1917; Diels in Engl. Bot.

Jahrb. 65: 100. 1932; 侯宽昭, 中国种子植物科属辞典 340. 1958;

云南植物志 2: 89. 1979.

灌木,茎幼时四棱形,棱上通常具狭翅,以后近圆形。叶片膜质或纸质,边缘通常具细锯齿或刺毛状疏缘毛,3—5基出脉,侧脉平行,细脉网状;具叶柄。由伞形花序组成伞房花序,稀伞形花序,通常顶生于分枝顶端;苞片小,通常披针形或三角状披针形;小苞片成对,通常为三角形;花梗四棱形,花萼钟形,通常近中部缢缩,四棱形,具8脉,其中4脉较明显,裂片4,顶端具小尖头或锐尖,通常与花萼垂直;花瓣4,粉红色至紫红色,卵形或长卵形,不对称,偏斜;雄蕊8,长4短4,花药圆柱状披针形或披针形,基部无疣,药隔基部不膨大或微突起成短距;子房下位,4室,顶端常具齿,花柱细长,柱头点尖。蒴果球状或卵状坛形,四棱形,顶端常微露出宿存萼;宿存萼通常无毛,顶端平截,与果贴生;种子长楔形或狭三角形,略有棱,长约0.5毫米或更小,多数,密布不明显的小突起。

2种,分布于缅甸、越南、我国西南及广西。我国有2种及2变种。

分种检索表

1. 叶柄有毛及刺毛……………1. 偏瓣花 *P. esquirolii* (Lévl.) Rehd.
 2. 叶片狭,长6—14厘米,宽2.5—4厘米,边缘具明显的细锯齿,基出脉3(—5);叶柄具被鳞片及平展的刺毛……………1a. 偏瓣花(原变种) *P. esquirolii* (Lévl.) Rehd. var. *esquirolii*
 2. 叶片宽,长8—13.5厘米,宽4.5—6.5厘米,边缘齿不明显,近全缘,基出脉7,其中近边缘两条不明显;叶柄密被微柔毛及短刺毛……………1b. 七脉偏瓣花(变种) *P. esquirolii* (Lévl.) Rehd. var. *septemnervium* C. Chen
1. 叶柄无毛……………2. 光叶偏瓣花 *P. serratum* (Diels) Diels
 3. 花萼棱上具棍棒状腺毛,幼枝、花序总梗棱上具棍棒状腺毛;叶片大,长3—7厘米,宽1.3—2.2厘米……………2a. 光叶偏瓣花(原变种) *P. serratum* (Diels) Diels var. *serratum*
 3. 花萼无毛或被微柔毛,幼枝、花序总梗棱上具疏刺毛或微柔毛;叶片小,长1.8—4.5厘米,宽约8毫米……………2b. 四棱偏瓣花(变种) *P. serratum* (Diels) Diels var. *quadrangulum* (Rehd.) C. Chen