

1. 偏瓣花(中国高等植物图鉴)

Plagiopetalum esquirolii (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 110. 1934, excl. syn. *P. quadrangulum* Rehd.; Chun in Sunyatsenia 4: 192. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 10. 1944, excl. syn. *P. quadrangulum* Rehd. et *P. serratum* (Diels) Diels; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 400. 1972; 中国高等植物图鉴 2: 1004. 图 3737. 1972, p. p., quoad pl. Kweichow. et Yunnan., Kwangsi.; 云南植物志 2: 90. 1979, excl. pl. Yunnan. (Lushui)——*Sonerila esquirolii* Lévl. in Bull. Soc. Bot. France 54: 368. 1907 et in Fedde Rep. Sp. Nov. 11: 498. 1913——*Barthea cavaleriei* Lévl. in Fedde Rep. Sp. Nov. 8: 61. 1910, p. p., quoad J. Esquirol 215——*B. blinii* Lévl. l. c. 11: 494. 1913——*Allomorphia blinii* (Lévl.) Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 86. 1913; Lévl. Fl. Kouy-Tchéou 276. 1914——*S. henryi* Kränzl. in Viert. Nat. Ges. Zurich 76: 152. 1931——*P. serratum* (Diels) Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 100. 1932, p. p. maj., quoad pl. Kweichow. et Yunnan. (specim. Henry 9077 A, 9077B, 9721)——*A. flexuosa* Hand-Mazz. in Sinensia 3: 195. 1933——*P. henryi* (Kranzl.) S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 172. pl. 2, f. 11. 1952——*P. blinii* (Lévl.) C. Y. Wu ex C. Chen, 云南植物志 2: 92. 图版 24, 7—8. 1979.

1a. 偏瓣花(原变种) 刺柄偏瓣花(云南植物志) 图版 36: 6—7

var. *esquirolii*

灌木,高0.5—1.2米;茎幼时四棱形,棱上具狭翅,翅上常具疏刺毛及微柔毛,以后近圆柱形,翅不明显,分枝多。叶片膜质或略厚,披针形至卵状披针形,顶端渐尖,基部钝或圆形,长6—14厘米,宽2.5—4厘米,边缘具整齐的细锯齿或近全缘而具刺毛状疏缘毛,3—5基出脉,5脉时近边缘的2条不明显,叶面近无毛或被疏微柔毛及极疏的糙伏毛,基出脉下凹,侧脉微凹,背面除基出脉密被微柔毛及疏糙伏毛,侧脉密被微柔毛外,其余无毛或被微柔毛,基出脉、侧脉隆起;叶柄密被鳞片及平展的刺毛,长4—20毫米,有槽。疏松的伞房花序或伞形花序组成复伞房花序,顶生或生于小枝顶叶腋,长1.5—7厘米,幼时常被鳞片及刺毛;花梗长6—10毫米,被极细的微柔毛;花萼钟形,长约8毫米,具四棱及8脉,其中4脉明显,脉上常被平展的疏短刺毛及被极细的微柔毛,裂片卵形,背部常隆起菱形的翅,具小尖头;花瓣红色至紫色,稀粉红色,倒卵形,不对称,偏斜,长约6毫米;雄蕊长者长约11毫米,花药长约6毫米,短者长约8毫米,花药长约3毫米,药隔均不膨大或微膨大;子房顶端具4个三角形的齿。蒴果球形,具四棱,宿存萼顶端平截,冠以宿存萼片,直径约6毫米,无毛。花期8—9月,果期12月至翌年2月。

产贵州、云南、广西。生于海拔500—2000米的疏林下湿润的地方,林缘、路旁或草坡灌丛中。越南北部也有。模式标本采自贵州花园窑? (Hoa-quan-yao)