

见标本,待考。

2. 刺毛柏拉木

Blastus setulosus Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 106. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 15. 1944.

灌木,高约1米;小枝近圆柱形,初时被腺状褐色柔毛,以后无毛。叶片纸质,长圆形或披针状长圆形,顶端渐尖,基部楔形,长7—12厘米,宽2—3.5厘米,全缘或具极不明显的浅波状齿,齿尖具刺毛,3(—5)基出脉,若为5条时近边缘的两条极细且极靠边缘,叶面被极细的微柔毛及疏糙伏毛,基出脉微凹,背面被极细的微柔毛,基出脉隆起,侧脉微隆起,均密被微柔毛;叶柄长1.5—3.5厘米,被密微柔毛。伞状聚伞花序,有花约3(—5)朵,生于无叶的茎上,总梗几无,花梗极短或几无;花萼钟状漏斗形,具四棱,密被小腺点,长约3.5毫米,裂片卵形或卵状三角形,长不到1毫米;花瓣白色,卵形(原描述狭长的菱形)顶端渐尖,具小尖头,1侧偏斜,长约4毫米,宽约2.5毫米;雄蕊4,等长,花丝长3—4毫米,花药长约4.5毫米,基部无瘤(原描述具小瘤),药隔微膨大;子房下位,坛形,顶端具4突起,被小腺点。蒴果椭圆形,4裂;宿存萼与果等大等长,檐部平截,被小鳞片。花期约7月,果期约8月。

产广西、广东(海南岛未发现)。生于海拔250—860米的山谷林下。模式标本采自广西金秀。

本种与柏拉木 *B. cochinchinensis* Lour. 很相近,但本种小枝被腺状褐色柔毛,叶背脉上密被微柔毛,边缘齿尖具刺毛,可以区别。

3. 云南柏拉木(云南植物志) 图版39: 8

Blastus tsaii H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 309. 1944——*B. yunnanensis* H. L. Li l. c. 15, non Lévl. (1912); 云南植物志 2: 104. 图版26, 8. 1979.

灌木,高1.5—2米;茎几圆柱形,具分枝,披散,幼时略四棱形,密被小腺点,以后渐脱落。叶片纸质或近膜质,长圆状披针形,稀椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,长8—15厘米,宽2.5—4.2厘米,全缘或具极不明显的小波状齿,3(—5)基出脉,叶面幼时被疏微柔毛,以后脱落,具小突起,基出脉、侧脉下凹,背面密被小腺点,基出脉、侧脉隆起,明显,细脉网状;叶柄长2—6厘米,密被小腺点。伞形花序,腋生,有花3—5朵,总梗极短或近无,花梗长约2毫米,被小腺点;花萼钟状漏斗形,长约5毫米,被小腺点,檐部呈浅波状4裂,顶端具小尖头;花瓣4,玫瑰色或浅红紫色,长圆状卵形,长4—4.5毫米,上部1侧偏斜,顶端渐尖,外面两侧近边缘具透明的小腺点;雄蕊4,等长,花丝长约2.5毫米,花药长约4毫米,微弯,药隔微膨大,延伸至花药基部,不呈瘤状;子房卵形,下位,4室,顶端具4小突起,被小腺点。果未见。花期约6月,果期未详。

产云南东南部。生于海拔800—1300米的山谷密林下,荫湿的地方或小溪边。模式标本采自云南屏边。