

本种与柏拉木 *B. cochinchinensis* Lour. 很相似, 但本种叶面幼时被疏微柔毛和具小突起, 叶柄通常较长(约 4 厘米); 花序几无柄, 花瓣玫瑰红色或浅红紫色, 花药不成曲膝等特征, 可以区别。与广西产的刺毛柏拉木 *B. setulosus* Diels 也相近, 但茎被小腺点, 叶边缘无刺毛, 雄蕊的结构也不相同, 可以区别。

4. 南亚柏拉木

Blastus cogniauxii Stapf in Hook. Icon. Pl. 24: t. 2311. 1894; Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 90, 403. 1913 et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 898. f. 98, 6. 1921; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 16. 1944; 海南植物志 2: 30. 1965——*Ochtocharis parviflora* Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 481. 1891, non *Blastus parviflorus* Triana.

灌木, 茎圆柱形, 分枝多, 小枝密被锈色微柔毛及小腺点, 以后无毛。叶片纸质或近膜质, 披针形至卵状披针形, 顶端渐尖, 基部楔形或钝, 长 11—21 厘米, 宽 3—6.5 厘米, 全缘, 5 基出脉, 叶面无毛, 基出脉微凹, 背面基出脉、侧脉明显, 隆起, 幼时被微柔毛, 其余密被黄色腺点; 叶柄 0.7—2 厘米, 被微柔毛。复聚伞花序, 腋生, 长约 3.5 厘米, 被微柔毛; 花梗长约 2 毫米, 具小鳞片; 苞片早落; 花萼钟状漏斗形, 具四棱, 长 4—5 毫米, 被小腺点, 裂片宽三角形, 顶端渐尖, 长约 1 毫米; 花瓣白色至黄色(?), 广卵形, 略偏斜, 边缘具不规则的缺刻, 长约 3 毫米, 宽约 1.5 毫米, 顶端渐尖, 外面多少被疏小腺点; 雄蕊 4, 等长, 花丝长约 3 毫米, 被小腺点, 花药长约 4 毫米, 呈曲膝状, 基部无瘤, 药隔不膨大; 花柱长约 1 厘米; 子房卵状椭圆形, 下位, 顶端具 4 小突起, 被小腺点。蒴果椭圆形, 4 裂, 为宿存萼所包; 宿存萼顶端平截, 被小腺点, 常冠以宿存萼片。花期约 4 月, 果期 8—9 月。有时 12 月有花。

产广东(仅海南岛)。生于海拔 60—1220 米的山谷、山坡或缓坡林下, 荫湿的地方或小溪旁。越南至印度尼西亚也有。

5. 薄叶柏拉木

Blastus tenuifolius Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 105. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 15. 1944.

灌木, 高约 1 米; 小枝幼时密被腺状淡黄褐色疏柔毛。叶片薄膜质, 长圆形或狭卵状长圆形, 长 10—18 厘米, 宽 4—7.5 厘米, 顶端长渐尖, 基部楔形或微心形, 5 基出脉, 边缘具疏柔毛, 背面脉上被疏柔毛, 基出脉、侧脉明显, 隆起; 叶柄长 3—4 厘米。聚伞花序近簇生, 有花 3—5 朵, 腋生, 总梗短, 花梗长约 4 毫米, 与花萼均被疏微柔毛及小腺点; 花萼长约 3 毫米, 钟状漏斗形, 具四棱, 裂片短三角形, 长不到 1 毫米, 顶端具小尖头; 花瓣广卵形或近圆形, 粉红色, 1 侧偏斜, 顶端骤然短渐尖, 具刺状尖头, 长约 5 毫米, 宽约 4 毫米; 雄蕊等长, 花丝长约 4 毫米, 花药长约 3.5 毫米, 微弯, 基部具极不明显的小瘤, 药隔不下延; 子房近球形, 顶端平截, 微 4 裂, 多少被小腺点。花期约 10 月。