

本种与柏拉木 *B. cochinchinensis* Lour. 很相似, 但本种叶面幼时被疏微柔毛和具小突起, 叶柄通常较长(约 4 厘米); 花序几无柄, 花瓣玫瑰红色或浅红紫色, 花药不成曲膝等特征, 可以区别。与广西产的刺毛柏拉木 *B. setulosus* Diels 也相近, 但茎被小腺点, 叶边缘无刺毛, 雄蕊的结构也不相同, 可以区别。

4. 南亚柏拉木

Blastus cogniauxii Stapf in Hook. Icon. Pl. 24: t. 2311. 1894; Guillaum. in Bull. Soc. Bot. France 60: 90, 403. 1913 et in Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 898. f. 98, 6. 1921; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 16. 1944; 海南植物志 2: 30. 1965——*Ochtocharis parviflora* Cogn. in DC. Monogr. Phan. 7: 481. 1891, non *Blastus parviflorus* Triana.

灌木, 茎圆柱形, 分枝多, 小枝密被锈色微柔毛及小腺点, 以后无毛。叶片纸质或近膜质, 披针形至卵状披针形, 顶端渐尖, 基部楔形或钝, 长 11—21 厘米, 宽 3—6.5 厘米, 全缘, 5 基出脉, 叶面无毛, 基出脉微凹, 背面基出脉、侧脉明显, 隆起, 幼时被微柔毛, 其余密被黄色腺点; 叶柄 0.7—2 厘米, 被微柔毛。复聚伞花序, 腋生, 长约 3.5 厘米, 被微柔毛; 花梗长约 2 毫米, 具小鳞片; 苞片早落; 花萼钟状漏斗形, 具四棱, 长 4—5 毫米, 被小腺点, 裂片宽三角形, 顶端渐尖, 长约 1 毫米; 花瓣白色至黄色(?), 广卵形, 略偏斜, 边缘具不规则的缺刻, 长约 3 毫米, 宽约 1.5 毫米, 顶端渐尖, 外面多少被疏小腺点; 雄蕊 4, 等长, 花丝长约 3 毫米, 被小腺点, 花药长约 4 毫米, 呈曲膝状, 基部无瘤, 药隔不膨大; 花柱长约 1 厘米; 子房卵状椭圆形, 下位, 顶端具 4 小突起, 被小腺点。蒴果椭圆形, 4 裂, 为宿存萼所包; 宿存萼顶端平截, 被小腺点, 常冠以宿存萼片。花期约 4 月, 果期 8—9 月。有时 12 月有花。

产广东(仅海南岛)。生于海拔 60—1220 米的山谷、山坡或缓坡林下, 荫湿的地方或小溪旁。越南至印度尼西亚也有。

5. 薄叶柏拉木

Blastus tenuifolius Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 105. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 15. 1944.

灌木, 高约 1 米; 小枝幼时密被腺状淡黄褐色疏柔毛。叶片薄膜质, 长圆形或狭卵状长圆形, 长 10—18 厘米, 宽 4—7.5 厘米, 顶端长渐尖, 基部楔形或微心形, 5 基出脉, 边缘具疏柔毛, 背面脉上被疏柔毛, 基出脉、侧脉明显, 隆起; 叶柄长 3—4 厘米。聚伞花序近簇生, 有花 3—5 朵, 腋生, 总梗短, 花梗长约 4 毫米, 与花萼均被疏微柔毛及小腺点; 花萼长约 3 毫米, 钟状漏斗形, 具四棱, 裂片短三角形, 长不到 1 毫米, 顶端具小尖头; 花瓣广卵形或近圆形, 粉红色, 1 侧偏斜, 顶端骤然短渐尖, 具刺状尖头, 长约 5 毫米, 宽约 4 毫米; 雄蕊等长, 花丝长约 4 毫米, 花药长约 3.5 毫米, 微弯, 基部具极不明显的小瘤, 药隔不下延; 子房近球形, 顶端平截, 微 4 裂, 多少被小腺点。花期约 10 月。

产广西(金秀、岭溪)。生于海拔 630 米或不到 1500 米的林中或林缘水边。

本种与密毛柏拉木 *B. mollissimus* H. L. Li 极近似,但本种花梗、花萼均被微柔毛及小腺点,萼片短三角形等,可与之区别。

6. 密毛柏拉木 图版 40: 8—10

Blastus mollissimus H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 16. 1944.

灌木,茎圆柱形,多少被长柔毛,分枝多,幼枝、叶背、叶柄、花梗、花萼均密被棕褐色长柔毛。叶片纸质至膜质,卵形或披针状卵形,顶端渐尖,基部钝至圆形,长 6.5—18 厘米,宽 2.5—8.5 厘米,边缘具啮蚀状细齿,齿尖具刺毛,5 基出脉,叶面幼时被疏微柔毛,以后无毛,基出脉下凹,背面基出脉、侧脉隆起,细脉网状,明显;叶柄长 2—6.5 厘米。聚伞花序近簇生,有花约 3 朵,腋生,花梗长约 2 毫米;花萼漏斗形,具钝四棱,长 3—4 毫米,裂片线形,长 3—4 毫米;花瓣长圆形,上部偏斜,近菱形,顶端渐尖,长约 8 毫米,宽约 4 毫米;雄蕊 4,花丝长约 4 毫米,花药披针形,微弯,基部具不明显的小瘤,药隔不伸延,长约 5 毫米;子房下位,卵形,顶端具冠,冠 4 裂,裂片平截,多少具小腺点。果未详。花期 7 月。

产广西,见于溪边。模式标本采自广西金秀。

7. 耳基柏拉木(云南植物志) 图版 39: 4—5

Blastus auriculatus Y. C. Huang ex C. Chen, 云南植物志 2: 103. 图版 26, 4—5. 1979.

灌木,茎圆柱形,分枝多,披散,密被小腺点。叶片纸质,提琴状椭圆形,顶端渐尖,基部耳垂形,长 13—24 厘米,宽 4.5—8 厘米,全缘,离基 3 出脉,叶面幼时具小腺点,以后除基出脉外,腺点脱落,基出脉下凹,密被腺点,背面密被小腺点,脉隆起,明显,细脉网状;叶无柄。聚伞花序,腋生,具 5—9 朵花,长约 1 厘米,密被腺点;苞片小,早落;花梗长约 2 毫米,密被小腺点;花萼长漏斗形,长约 3.5 毫米,密被小腺点,具四棱,波状 4 裂,裂片长约 0.5 毫米,具点尖头;花瓣白色,卵形,长约 2.2 毫米,顶端渐尖,全缘;雄蕊 4,等长,花丝长约 2 毫米,花药长约 3.5 毫米,药隔微膨大,下延直达花药基部,末端尖且微上弯;子房下位,坛形,被疏小腺点,顶端具 4 个小突起。蒴果椭圆形,4 裂,为宿存萼所包;宿存萼较果长,长约 3.5 毫米,直径约 2 毫米,檐部具 4 齿,近中部缢缩,密被腺点,钝四棱形。花期约 6 月,果期约 7 月。

产云南东南部。生于海拔约 220 米的林内或竹林内。模式标本采自云南河口。

组 2. 顶花柏拉木组——Sect. *Thyrsoblastus* Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 106. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 14. 1944.

圆锥花序顶生,总梗长 4 厘米以上;花冠粉红色或红色。

8. 线萼金花树

Blastus apricus (Hand.-Mazz.) H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 19. 1944