

Soc. Bot. 23: 300. 1887—*Oxyspora?* *pauciflora* Benth. Fl. Hongk. 116. 1861
—*B. hindsii* Hance in Journ. Linn. Soc. Bot. 13: 103. 1873.

灌木，高约 70 厘米；茎圆柱形，分枝多，被微柔毛及黄色小腺点，幼时更密。叶片纸质，卵状披针形至卵形，顶端短渐尖，基部钝至圆形，有时略偏斜，长 3.5—6 厘米，宽 1.3—2.3 厘米，近全缘或具极细的小齿，3—5 基出脉，叶面基出脉微凹，被微柔毛，侧脉不明显，背面基出脉、侧脉隆起，密被微柔毛及疏腺点，其余密被黄色小腺点；叶柄长 4—10 毫米，密被微柔毛及疏小腺点。由聚伞花序组成小圆锥花序，顶生，长约 5 毫米，宽 3 毫米，密被微柔毛及疏小腺点；苞片不明显，花梗长约 1 毫米，与花萼均被黄色小腺点；花萼漏斗形，具四棱，长约 3 毫米，裂片短三角形，长不到 1 毫米；花瓣粉红色至紫红色，卵形，顶端急尖，偏斜，长约 2.5 毫米，外面顶端有时多少被小腺点；雄蕊 4，花丝长约 3 毫米，多少被微柔毛，花药披针形，微弯，长约 3 毫米，基部微分开，具不明显的小瘤，药隔微膨大，微下延至基部分开；子房半下位，顶端具 4 小突起，多少被小腺点。蒴果椭圆形，为宿存萼所包；宿存萼漏斗形，具 4 棱形，长约 3 毫米，直径约 2 毫米，被黄色小腺点。花期 7 月，果期 10 月。

产广东（海南岛未发现），见于低海拔的山坡，林下。模式标本可能是采自广东定安沿海岛屿。据记载江西亦有，但我们未见标本。

全株治疮疥，用于拔毒生肌。

10. 留行草(江西) 大莎药(广东)

Blastus ernae Hand.-Mazz. in Anz. Akad. Wiss. Wien Math.-Nat. 59: 106.
1922 et in Beih. Bot. Centralbl. 52: 161. 1934; H. L. Li in Journ. Arn. Arb.
25: 18. 1944.

灌木，高 0.6—2 米；茎圆柱形，分枝多，幼枝密被微柔毛及小腺点。叶片纸质，卵形至披针状卵形，顶端渐尖，基部圆形至微心形，长 (5.5—) 8—15.5 厘米，宽 (2.5—) 3—7.3 厘米，全缘或具不明显的细齿牙，5 基出脉，叶面仅基出脉被微柔毛，微凹，侧脉微凸，背面基出脉、侧脉隆起，被微柔毛及小腺点，其余密被黄色小腺点；叶柄长 1—2.5 厘米，密被微柔毛及小腺点。由聚伞花序组成的圆锥花序，顶生，长 7.5—10.5 厘米，宽 3—4 厘米，被微柔毛，有时尚被疏腺毛；苞片早落，花梗长约 2 毫米，与花萼均密被微柔毛及有柄黄色腺毛；花萼漏斗形，具四棱，长约 4 毫米，裂片广三角形，顶端渐尖，长约 1 毫米；花瓣红色，倒卵状长圆形，顶端广急尖，略偏斜，长约 3.5 毫米，外面多少具小腺点；雄蕊 4，花丝长约 8 毫米，被微柔毛；花药线状披针形，微弯，基部呈羊角状，长约 8 毫米，药隔不膨大；子房下位，卵形，顶端具 4 小突起，被小腺点。蒴果椭圆形，4 纵裂，为宿存萼所包；宿存萼漏斗形，顶端平截，冠以宿存萼片，长 6—8 毫米，直径 3—4 毫米，密被微柔毛及腺毛。

花期约 6 月，果期 8—9 月。

产湖南、广东（海南岛未发现）、江西。生于海拔 350—800 米的山谷林下，溪边水旁。模式标本采自广东与湖南接壤的蛮子山 (Mandse shan)。