

药线形,弯曲,长约6毫米,基部微膨大,呈不明显的小瘤;子房半下位,卵形,顶端具4小突起,无毛。蒴果椭圆形,4纵裂,为宿存萼所包;宿存萼顶端平截,被小腺点,长约4毫米,直径2.5毫米,常冠以宿存萼片。花期6—8月,果期8—11月。

产云南、贵州、湖南、广西、广东(海南岛未发现)。生于海拔100—1600米的山坡、山谷的疏、密林下,潮湿的路旁或灌丛中。模式标本采自贵州独山。

叶供药用,可止血。

12b. 腺毛柏拉木(变种)

var. tomentosus (H. L. Li) C. Chen, 植物研究, 4(3): 35. 1984. — *B. tomentosus* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 18. 1944, non Bakh. f. (1943) — *B. lii* Nayar in Current Sci. Bengal. 37: 414. 1968.

本变种与前者主要区别是,小枝、叶背的基出脉及侧脉、叶柄、花序总梗均被平展的腺毛(原描述为刺毛状绒毛)及微柔毛;花药基部略膨大,较明显。花果期9月,有同一植株上,上部开花,下部果熟的情况。

产广东西北部,见于潮湿的地方。模式标本采自广东怀集党山。

13. 短柄柏拉木 图版41: 2—3

Blastus brevissimus C. Chen, 植物研究, 4(3): 35. 1984.


小灌木,高约50厘米;茎圆柱形,少分枝,幼时密被锈色微柔毛及腺毛或刚毛。叶片纸质,卵形至披针状卵形,顶端渐尖,基部圆形或近心形,长15—17厘米或更长,宽5—6厘米,全缘或具极不明显的细锯齿,5基出脉,叶面除基出脉微凹,被微柔毛外,其余无毛,侧脉平整,背面基出脉及侧脉均隆起,被微柔毛及极疏的平展刺毛,细脉网状,明显,具黄色小腺点;叶柄极短或无柄。由聚伞花序组成小圆锥花序,顶生,长约4厘米,宽约2厘米,与花梗均被微柔毛,苞片早落,花梗长2—3毫米;花萼漏斗形,具4棱,长约5毫米,被小腺点,裂片匙形,顶端圆形,长约2.5毫米,被小腺点;花瓣红色,长圆状卵形,顶端渐尖,基部钝,长约4毫米;雄蕊4,花丝长约4毫米;花药线状披针形,微弯曲,基部平截,药隔前伸呈盘状,长约6毫米;子房半下位,卵形,顶端具4小突起,多少具小腺点。蒴果椭圆形,4纵裂,为宿存萼所包;宿存萼顶端平截,常冠以宿存萼片,长约6毫米,直径约4毫米,具4棱,被小腺点。花期约8月,果期约10月。

产广西东部。生于海拔约400米的山坡。模式标本采自广西昭平。

本种与匙萼柏拉木 *B. cavaleriei* Lévl. et Van. 相近,但花序较短,长约4厘米,叶柄极短或无柄,极易区别。

14. 金花树(广西)

Blastus dunnianus Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 9: 449. 1911 et Fl. Kouy-Tchéou 276. 1914; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 107. 1932; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 144. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 17. 1944;



1. 七脉偏瓣花 *Plagiopetalum esquirolii* (Lévl.) Rehd. var. *septemnervium* C. Chen: 果枝。
 2—3. 短柄柏拉木 *Blastus brevissimus* C. Chen: 2. 花果枝, 3. 花。4—5. 斑叶锦香草 *Phyllagathis scorpiothyrsoides* C. Chen: 4. 果枝, 5. 果。(肖溶绘)