

药线形,弯曲,长约6毫米,基部微膨大,呈不明显的小瘤;子房半下位,卵形,顶端具4小突起,无毛。蒴果椭圆形,4纵裂,为宿存萼所包;宿存萼顶端平截,被小腺点,长约4毫米,直径2.5毫米,常冠以宿存萼片。花期6—8月,果期8—11月。

产云南、贵州、湖南、广西、广东(海南岛未发现)。生于海拔100—1600米的山坡、山谷的疏、密林下,潮湿的路旁或灌丛中。模式标本采自贵州独山。

叶供药用,可止血。

12b. 腺毛柏拉木(变种)

var. tomentosus (H. L. Li) C. Chen, 植物研究, 4(3): 35. 1984. — *B. tomentosus* H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 18. 1944, non Bakh. f. (1943) — *B. lii* Nayar in Current Sci. Bengal. 37: 414. 1968.

本变种与前者主要区别是,小枝、叶背的基出脉及侧脉、叶柄、花序总梗均被平展的腺毛(原描述为刺毛状绒毛)及微柔毛;花药基部略膨大,较明显。花果期9月,有同一植株上,上部开花,下部果熟的情况。

产广东西北部,见于潮湿的地方。模式标本采自广东怀集党山。

13. 短柄柏拉木 图版41: 2—3

Blastus brevissimus C. Chen, 植物研究, 4(3): 35. 1984.

小灌木,高约50厘米;茎圆柱形,少分枝,幼时密被锈色微柔毛及腺毛或刚毛。叶片纸质,卵形至披针状卵形,顶端渐尖,基部圆形或近心形,长15—17厘米或更长,宽5—6厘米,全缘或具极不明显的细锯齿,5基出脉,叶面除基出脉微凹,被微柔毛外,其余无毛,侧脉平整,背面基出脉及侧脉均隆起,被微柔毛及极疏的平展刺毛,细脉网状,明显,具黄色小腺点;叶柄极短或无柄。由聚伞花序组成小圆锥花序,顶生,长约4厘米,宽约2厘米,与花梗均被微柔毛,苞片早落,花梗长2—3毫米;花萼漏斗形,具4棱,长约5毫米,被小腺点,裂片匙形,顶端圆形,长约2.5毫米,被小腺点;花瓣红色,长圆状卵形,顶端渐尖,基部钝,长约4毫米;雄蕊4,花丝长约4毫米;花药线状披针形,微弯曲,基部平截,药隔前伸呈盘状,长约6毫米;子房半下位,卵形,顶端具4小突起,多少具小腺点。蒴果椭圆形,4纵裂,为宿存萼所包;宿存萼顶端平截,常冠以宿存萼片,长约6毫米,直径约4毫米,具4棱,被小腺点。花期约8月,果期约10月。

产广西东部。生于海拔约400米的山坡。模式标本采自广西昭平。

本种与匙萼柏拉木 *B. cavaleriei* Lévl. et Van. 相近,但花序较短,长约4厘米,叶柄极短或无柄,极易区别。

14. 金花树(广西)

Blastus dunnianus Lévl. in Fedde Repert. Sp. Nov. 9: 449. 1911 et Fl. Kouy-Tchéou 276. 1914; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 107. 1932; Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 144. 1940; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 17. 1944;

中国高等植物图鉴 2: 1005. 图 3740. 1972; Lauener in Not. Bot. Gard. Edinb. 31: 398. 1972.

14a. **金花树**(原变种) 六便狼、谷皱草(广西), 巨萼柏拉木(中国高等植物图鉴) 图版 40: 5--7

var. dunnianus

灌木, 高约 1 米; 茎圆柱形, 分枝多, 幼时密被锈色微柔毛及黄色疏腺点。叶片纸质, 卵形、广卵形或稀长圆状卵形, 顶端渐尖, 基部钝至心形, 长 6.5—15(—25) 厘米, 宽 3—6(—10) 厘米, 全缘或具细波状齿, 5(—7) 基出脉, 叶面无毛, 基出脉微凹, 侧脉微凸, 背面基出脉、侧脉隆起, 被疏微柔毛, 细脉网状, 被黄色小腺点; 叶柄长 1—2 厘米, 密被微柔毛及疏小腺点。由聚伞花序组成的圆锥花序, 顶生, 长 5—9 厘米, 宽约 3.5 厘米, 被微柔毛及小腺点; 苞片早落, 花梗长约 2 毫米; 花萼漏斗形, 具 4 棱, 长约 3 毫米, 被小腺点, 裂片反折, 卵形或椭圆状卵形, 顶端圆形, 长约 1.5 毫米; 花瓣粉红色至玫瑰色或红色, 卵形, 顶端急尖, 基部钝, 略平截, 长约 3.5 毫米; 雄蕊 4, 花丝长约 6 毫米; 花药线形, 弯曲, 基部具不明显的小瘤, 长约 5 毫米, 药隔微延长呈瘤状的小短距; 子房半下位或下位, 卵形, 顶端具 4 小突起, 每个突起顶端微凹。蒴果椭圆形, 4 纵裂, 为宿存萼所包; 宿存萼顶端平截, 冠以宿存萼片, 长约 5 毫米, 直径约 3 毫米, 具 4 棱, 被小腺点。花期 6—7 月, 果期 9—11 月。

产贵州、湖南、广西、广东(海南岛未发现)、江西、福建。生于海拔 230—1520 米的山谷、山坡疏、密林下, 土壤肥厚的地方, 溪边或路旁。模式标本采自贵州龙里麻若场。

全株供药用, 治风湿及止血, 叶可敷疮疖。

14b. **腺毛金花树**(变种) 大痧药、痧药(湖南)

var. glandulo-setosus C. Chen, 植物研究, 4(3): 36. 1984.

本变种与前者主要区别是, 幼枝、花序、叶柄, 有时于叶背基出脉基部被腺状刺毛。

产湖南南部及广东北部。生于海拔 400—1400 米的山谷、山坡或山顶密林下, 阴湿的地方或溪边。模式标本采自湖南宜章莽山。

3. 蜂斗草族——Trib. Sonerileae Triana

Triana in Bull. Congr. Amsterd. 457. 1865 et in Trans. Linn. Soc. 28: 5. 1871; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 731 1867, excl. ser. *Americanae*——*Miconieae* DC. Prodr. 3: 152. 1828, p. p.——*Miconales* subtrib. *Sonerileae* Naud. in Ann. Sci. Nat. ser. 3, 15: 315. 1851, p. p.——*Cassebeerieae* Krass. in Engl. u. Prantl Pflanzenfam. 3 (7): 147. 1898, p. p.