

物图鉴 2: 1009. 图 3748. 1972——*Allomorpha cavaleriei* Lévl. et Van. in Mem. Soc. Nat. Sci. Nat. Math. Cherbourg 35: 394. 1906; Lévl. in Fedde Repert. Nov. Sp. 4: 94. 1907——*Oxyspora cavaleriei* Lévl. in herb., l. c. (1906 et 1907), pro syn. *Allomorpha cavaleriei*.

26a. 锦香草 (原变种) 熊巴掌、熊巴耳、猫耳朵草、铺地毡 (广西)

var. *cavaleriei*

草本, 高 10—15 厘米; 茎直立或匍匐, 逐节生根, 近肉质, 密被长粗毛, 四棱形、通常无分枝。叶片纸质或近膜质, 广卵形、广椭圆形或圆形, 顶端广急尖至近圆形, 有时微凹, 基部心形, 长 6—12.5 (—16) 厘米, 宽 4.5—11 (—14) 厘米, 边缘具不明显的细浅波齿及缘毛, 7—9 基出脉, 两面绿色或有时背面紫红色, 叶面具疏糙伏毛状长粗毛, 脉平整, 背面仅基出脉及侧脉被平展的长粗毛, 有时毛脱落, 脉隆起; 叶柄长 1.5—9 厘米, 密被长粗毛。伞形花序, 顶生, 总花梗长 4—17 厘米, 被长粗毛, 稀几无毛或无毛; 苞片倒卵形或近倒披针形, 有时呈突尖三角形, 被粗毛, 通常仅有 4 枚, 长约 1 厘米或更大, 有时超过 4 枚, 但极小; 花梗长 3—8 毫米, 与花萼均被糠秕; 花萼漏斗形, 四棱形, 长约 5 毫米, 裂片广卵形, 顶端点尖, 长约 1 毫米; 花瓣粉红色至紫色, 广倒卵形, 上部略偏斜, 顶端急尖, 长约 5 毫米; 雄蕊近等长, 长 8—10 毫米, 花药长 4—5 毫米, 基部具小瘤或瘤不甚明显, 药隔下延呈短距; 子房杯形, 顶端具冠。蒴果杯形, 顶端冠 4 裂, 伸出宿存萼外约 2 毫米, 直径约 6 毫米; 宿存萼具 8 纵肋, 果梗伸长, 被糠秕。 花期 6—8 月, 果期 7—9 月。

产湖南、广西、广东 (海南岛未发现)、贵州、云南。生于海拔 400—1500 米的山谷、山坡疏、密林下荫湿的地方或水沟旁。模式标本采自贵州平坝。

本种叶形及植株所被毛被变化很大, 有的植株带紫红色或几无毛。

全株烧灰治耳朵出脓 (可能是中耳炎?); 亦作猪饲料。

26b. 短毛熊巴掌 (变种) (云南植物志) 猫耳朵、熊巴耳 (广西), 猪婆耳、豆角消 (江西), 虎耳、叶下红 (福建)

var. *tankahkeei* (Merr.) C. Y. Wu ex C. Chen, 云南植物志 2: 111. 1979——*Phyllagathis tankahkeei* Merr. in Lingn. Sci. Journ. 7: 316. 1929; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 115. 1932.

本变种与前者的区别是, 叶背于基出脉及侧脉上, 除被平展的长粗毛外, 尚有短刺毛; 花萼有时被疏长刺毛。 花期 5—8 月, 果期 8—10 月。

产云南、贵州、湖南、广西、广东 (海南岛未发现)、江西、福建。生于海拔 300—1400 米的山谷、山坡密林下荫湿的地方及水旁。模式标本采自福建南平。

全株药用, 有清凉作用, 又用叶嫩肉吃有滋补作用; 也作猪饲料。

26c. 长柄熊巴掌 (变种)

var. *wilsoniana* Guillaum. in Lecte. Not. Syst. 2: 325. 1913 et in Bull.

Soc. Bot. France 60: 273, 404. 1913; Diels in Engl. Bot. Jahrb. 65: 115. 1932; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 30. 1944, in not.—*P. longipes* H. L. Li l. c. 31.

本变种与原变种的区别是,茎被绒毛;叶片卵形或广卵形,顶端急尖或渐尖,两面被微柔毛及糙伏毛;叶柄被绒毛,通常较叶片长;雄蕊花药基部通常无疣;子房坛形,顶端缢缩成冠。

产四川西部、云南。生于海拔 2100—3100 米的山坡、山谷密林下荫湿的地方。模式标本采自四川西部康定。

27. 猫耳朵 (云南) 图版 47: 1—5

Phyllagathis wenshanensis S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 33: 171. 1952, 云南植物志 2: 111. 图 28, 1—5. 1979.

草本,高 10—20 厘米,具匍匐茎,逐节生根;茎四棱形,近肉质,密被绒毛,以后粗糙。叶片纸质近膜质,圆形或卵状圆形,顶端钝或微凹,基部心形,长 6—8 厘米,宽 5.5—8.5 厘米,全缘,具缘毛,9 基出脉,叶面被糙伏毛及微柔毛,基出脉平整,侧脉微隆起,背面被糙伏毛,脉上密被微柔毛,脉隆起,明显;叶柄长 2.5—8 厘米,肉质,密被绒毛。伞形花序,顶生或近顶生,有花约 8 朵;总梗(或花葶)长 (2—)11 厘米,肉质,密被绒毛;苞片卵形或披针形,长 8—10 毫米,全缘,具长缘毛,外面被微柔毛,早落;花梗长约 5 毫米,密被微柔毛,基部具钻形小苞片,密被微柔毛;花萼漏斗形,具四棱,长约 6 毫米,被微柔毛,裂片宽三角形,顶端急尖,长约 1 毫米;花瓣广卵形,略偏斜,长约 6 毫米;雄蕊 4 长 4 短,长者花药长约 9 毫米,花丝长约 6 毫米,短者花药长约 6 毫米,花丝长约 5 毫米,花药前面基部无疣,药隔基部微膨大,伸延呈短距;子房坛形,顶端具膜质冠,冠缘具 8 枚小齿。蒴果浅杯形,长约 4 毫米,直径约 7 毫米,冠微伸出宿存萼;宿存萼被微柔毛,檐部具 8 波状齿,梗长约 1.5 厘米。花期约 5 月,果期约 8 月。

产云南东南部。生于海拔 2100—2400 的山谷、山坡密林下或苔原林下荫湿的地方。模式标本采自云南文山。

本种与锦香草 *P. cavaleriei* (Lévl. et Van.) Guillaum. var. *cavaleriei* 很相近,但本种茎被绒毛,叶面除被糙伏毛外,尚有微柔毛,背面脉上被微柔毛等,可以区别。

28. 细辛锦香草 图版 50: 5—7

Phyllagathis asarifolia C. Chen, 植物研究, 4(3): 56. 1984.

草本,茎粗短,长约 3 厘米,匍匐或直立,具明显的叶迹。叶基生,具长柄,叶片纸质,圆形至卵状圆形,顶端圆形或微凹,有时骤然急尖,基部心形,长宽约 11 厘米,边缘具极小的细锯齿,基出脉 9—11,幼时两面被微柔毛,叶面尚被疏短糙伏毛,以后渐疏或脱落成几无毛,基出脉及侧脉于叶面微隆起,于背面隆起;叶柄长 13—16 厘米,幼时被微柔毛,以后无毛。伞形花序,顶生,有花约 9 朵,总梗(或花葶)长 12—15 厘米,与花梗均被微柔毛,花