

状长缘毛膜质的盘;花瓣粉红色,倒卵形,顶端平截,偏斜,另1侧具小尖头,长约7毫米;雄蕊等长,花丝向下渐宽,花药长为花丝的1/2,药隔基部下延成极短的距或微突起,距长为药室长的1/4—1/3,上弯;子房顶端具膜质冠,冠缘浅波状,微4裂。蒴果杯形,具四棱,膜质冠伸出萼1倍;宿存萼及裂片与花时同。花期8—10月,果期9—12月。

产西藏、云南、四川、贵州、湖北、湖南、广西、广东(海南岛未发现)、江西、福建。生于海拔1300—3200米的密林下荫湿的地方或溪边。尼泊尔、缅甸至马来西亚等也有。

全草入药,有清肝明目的作用,治耳鸣及目雾等症或祛肝火。

2b. 斑点栳头红(变种)

var. *maculata* C. Y. Wu ex C. Chen, 云南植物志 2: 121. 1979——*S. nepalensis* auct. non Wall.; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 25. 1944, p. p. min., quoad specim. C. W. Wang 67119.

本变种与前者主要区别是,叶面毛的基部具白色小圆斑点。果期11—12月或翌年1月。

产云南。生于海拔1000—2300米的林下湿润处或溪边。模式标本采自云南贡山。

3. 圆齿肉穗草(云南植物志)

Sarcopyramis crenata H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 26. 1944; 云南植物志 2: 121. 1979——*S. nepalensis* auct. non Wall.; Hansen in Bot. Tidsskrift 73(3—4): 180. 1980, p. p.

细弱草本,高可达7厘米,直立或近平卧,全株无毛;茎无分枝,四棱形,棱上略具狭翅。叶片几膜质,卵形至近圆形,顶端钝或近圆形,基部广楔形或近圆形,长宽1厘米或长8—14毫米,宽6—11毫米,边缘具圆齿,中脉于叶面微凹,背面微隆起,侧脉不明显;叶柄长3—5毫米,纤细。花未详。果顶生或腋生,单1,果梗长5—10毫米,具四棱;蒴果未成熟,杯形,具四棱,长约2.5毫米,宽5毫米,宿存萼片横长圆形至卵状横长圆形,膜质,顶端平截,长约2毫米,宽达4毫米。花期约3月。

产云南。生于海拔约1950米的山谷。模式标本采自云南镇康。

本种除植株较矮小及无毛外,萼片横宽与本属其他种极易区别。

4. 小叶肉穗草

Sarcopyramis parvifolia Merr. ex H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 26. 1944——*S. nepalensis* auct. non Wall.; Hansen in Bot. Tidsskrift 73 (3—4): 180. 1980, p. p.

矮小草本,高约5厘米,匍匐上升,具走茎,逐节生根,无分枝,四棱形,无毛。叶片纸质或近膜质,卵形或近圆形,稀圆形,顶端极钝,基部圆形,长0.5—1.1厘米,宽5—8毫米,边缘具细锯齿,3基出脉,叶面被疏糙伏毛,中脉微凹,其余脉不明显,背面基出脉微