

11. 叶片两面密布小突起,粗糙,无光泽;膨大的圆锥形药隔脊上具1环状体,花瓣广卵形
10. 细叶谷木 *M. scutellatum* (Lour.) Hook. et Arn.
 11. 叶片两面光亮;膨大的圆锥形药隔脊上无环,花瓣广披针形
 11. 黑叶谷木 *M. nigrescens* Hook. et Arn.

1. 狭叶谷木 革叶羊角扭(台湾)

Memecylon lanceolatum Blanco Fl. Philipp. 301. 1837; Chang in For. Journ. Pingt. 6: 3. pl. 4. 1964; Hatusima in Mem. Fac. Agr. Kagoshima Univ. 7:318. 1970; H. Keng et H. L. Li in Fl. Taiwan 3: 858. 1977.

灌木或小乔木。叶片厚革质,卵形至卵状长圆形,顶端渐尖,具钝圆尖头,基部楔形,通常长6—12厘米,宽2—5厘米,两面无毛,中脉于叶面微凹,背面隆起,明显,侧脉约6对,不明显;叶柄无或长2—3毫米,粗壮。密集的聚伞花序,腋生,总梗长2—3毫米,具极小的小苞片,花梗长1—2毫米,花极小,直径1—2毫米。

产我国台湾台东至兰屿岛。习见于密林缘溪边。菲律宾、印度尼西亚也有。

本文摘自《台湾植物志》。

2. 蓝果谷木(云南植物志) 图版56: 6—9

Memecylon cyanocarpum C. Y. Wu ex C. Chen, 云南植物志 2: 134. 图版32, 6—9. 1979.

大灌木或小乔木,高3—12米;小枝圆柱形,无毛,分枝多。叶片革质,椭圆形或广椭圆形,顶端渐尖,基部楔形,长8.5—11(—14.5)厘米,宽3.8—6(—7.5)厘米,全缘,两面无毛,叶面中脉下凹,侧脉微隆起,近边缘网结形成边缘脉,背面中、侧脉隆起,细脉不明显;叶柄5—7毫米,具槽。聚伞花序,腋生,稀近顶生,长约3厘米,无毛,总梗长0.5—1.2厘米;苞片小,披针形,基部两侧多少具髯毛,长约0.5毫米,裂片广卵形,具小尖头;花瓣白色或黄绿色,基部浅蓝色,披针形或略宽,中下部略偏斜,顶端渐尖,长约3毫米;雄蕊蓝色,花药下弯,长约1毫米,药室及膨大的圆锥形药隔长约1毫米,脊上具1环状体;子房下位,顶端具8条放射状的槽,槽边缘隆起,无毛。浆果状核果球形,外皮多汁,成熟时紫蓝色,直径1.3厘米,无毛,顶端具环状宿存萼檐。花果期4—5月。

产云南、西藏。生于海拔950—1060米的密林中荫湿处。模式标本采自云南普文。

果可食,味甜。

本种与海南谷木 *M. hainanense* Merr. et Chun 相近,但本种萼片广卵形,花萼长约1.5毫米,花瓣披针形或略宽,果大,直径1.3厘米,可以区别。

3. 海南谷木(海南植物志)

Memecylon hainanense Merr. et Chun in Sunyatsenia 2: 44. 1934; H. L. Li in Journ. Arn. Arb. 25: 41. 1944; 海南植物志 2: 40. 图310. 1965; 云南植物志 2: 136. 1979.