

Raven 曾录入《台湾植物志》(1977), 该亚种幼叶被柔毛, 花盘有毛, 与更小种子 (长 0.7—1 毫米), 实际上在台湾并未见其野生居群, 故未被录入本志。

5. 草龙 (海南植物志) 细叶水丁香 (台湾植物志), 线叶丁香蓼 (云南植物志)

Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell, Garcia de Orta **5**: 471. 1957; Raven in Reinwardtia **6**: 385. 1963, et in H. L. Li, Fl. Taiwan **3**: 891. 1977, et in T. C. Huang, l. c. ed. 2. **3**: 955. pl. 478. 1993; 云南植物志 **4**: 186, pl. 55 (11—13). 1986. — *Jussiaea linifolia* Vahl in Eclog. Am. **2**: 32. 1798, non *L. linifolia* Poir. 1813; Gagnep., Fl. Gén. Indo-Chine **2**: 985. 1921; Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. **16**: 395. 1937; 海南植物志 **1**: 430. 1965. — *J. hyssopifolia* G. Don, Gen. Syst. **2**: 693. 1832. — *J. micrantha* Kunze in Linnaea **24**: 177. 1851. — *L. micrantha* (Kunze) Hara in J. Jap. Bot. **28**: 293. 1953.

一年生直立草本; 茎高 60—200 厘米, 粗 5—20 毫米, 基部常木质化, 常 3 或 4 棱形, 多分枝, 幼枝及花序被微柔毛。叶披针形至线形, 长 2—10 厘米, 宽 0.5—1.5 厘米, 先端渐狭或锐尖, 基部狭楔形, 侧脉每侧 9—16, 在近边缘不明显环结, 下面脉上疏被短毛; 叶柄长 2—10 毫米; 托叶三角形, 长约 1 毫米, 或不存。花腋生, 萼片 4, 卵状披针形, 长 2—4 毫米, 宽 0.5—1.8 毫米, 常有 3 纵脉, 无毛或被短柔毛; 花瓣 4, 黄色, 倒卵形或近椭圆形, 长 2—3 毫米, 宽 1—2 毫米, 先端钝圆, 基部楔形; 雄蕊 8, 淡绿黄色, 花丝不等长, 对萼的长 1—2 毫米, 对瓣生的长 0.5—1 毫米; 花盘稍隆起, 围绕雄蕊基部有密腺; 花柱淡黄绿色, 长 0.8—1.2 毫米; 柱头头状, 径约 1 毫米, 顶端略凹, 浅 4 裂, 上部接受花粉。蒴果近无梗, 幼时近四棱形, 熟时近圆柱状, 长 1—2.5 厘米, 径 1.5—2 毫米, 上部 1/5—1/3 增粗, 被微柔毛, 果皮薄。种子在蒴果上部每室排成多列, 游离生, 在下部排成 1 列, 牢固地嵌入在一个近锥状盒子的硬内果皮里, 近椭圆状, 长约 0.6 毫米, 径约 0.3 毫米, 两端多少锐尖, 淡褐色, 表面有纵横条纹, 腹面有纵形种脊, 长约为种子的 1/3。 花果期几乎四季。染色体数 $n=8$ 。

产台湾、广东、香港、海南、广西、云南南部。生于田边、水沟、河滩、塘边、湿草地等湿润向阳处, 海拔 50—750 米。分布于印度、斯里兰卡、缅甸、中南半岛经马来半岛至菲律宾、密克罗尼西亚与澳大利亚北部, 西达非洲热带地区。

全草入药, 能清热解毒、去腐生肌之效, 可治感冒、咽喉肿痛、疮疥等。

6. 水龙 (海南植物志) 玉钗草、草里银钗 (本草纲目拾遗), 过塘蛇 (海南、广州), 过江藤 (浙江), 猪肥草 (海南澄迈) 图版 10: 5—6

Ludwigia adscendens (L.) Hara in J. Jap. Bot. **28**: 290. 1953; Raven in