

有小叶 5—7; 叶柄长 4—8 厘米, 幼时密生短柔毛, 很快变无毛; 小叶片革质, 长圆状披针形, 稀椭圆状长圆形, 长 6—9 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端渐尖, 基部楔形, 两面均无毛, 边缘全缘, 反卷, 中脉仅下面隆起, 侧脉 5—6 对, 和稠密的网脉在两面甚明显而隆起; 小叶柄纤细, 长 0.5—2.5 厘米, 中央的较长, 两侧的较短, 被毛和叶柄一样。圆锥花序顶生, 长约 12 厘米; 分枝很少, 多少呈伞房状, 幼时被绒毛, 老时变稀至无毛; 伞形花序直径约 1 厘米, 总状排列在长约 7 厘米的分枝上; 总花梗长 1—1.5 厘米, 花梗长约 5 毫米, 均疏生星状绒毛; 萼长 1 毫米, 被毛或无毛, 边缘近全缘; 花瓣 5, 长约 2 毫米, 无毛; 雄蕊 5, 花丝长约 3.5 毫米; 子房 5 室; 无花柱, 柱头 5; 花盘稍隆起。果实卵形, 有 5 棱, 黄红色, 无毛, 连隆起的花盘长 6—7 毫米, 直径 5 毫米; 花盘五角形, 长为果实的 1/3。花期 4 月, 果期 5 月。

产广西(武鸣)、广东(广州栽培)。生于林下或石山上。模式标本采自广西扶绥。

本种广西民间称为七叶莲, 供药用, 治三叉神经痛、坐骨神经痛及神经性头痛等症。

本种习性和云南鹅掌柴 *Schefflera yunnanensis* Li 相似, 但本种果实卵球形, 较大, 可以区别。

13. 鹅掌藤(中国树木分类学) 七加皮(海南土名)

Schefflera arboricola Hay. Icon. Pl. Formos. 6: 23. 1916, as syn.; Merr. in Lingnan Sci. Journ. 2: 139. 1927; Kanehira, Formos. Trees rev. ed. 524. f. 486. 1936; 陈嵘, 中国树木分类学 938. f. 832. 1937; Li in Sargentia 2: 33. 1942 & Woody Fl. Taiwan 670. 1963—*Heptapleurum arboricolum* Hay. l.c. 6: 23. 1916—*Heptapleurum sasakii* Hay. l.c. 6: pl. 4. 1916.

藤状灌木, 高 2—3 米; 小枝有不规则纵皱纹, 无毛。叶有小叶 7—9, 稀 5—6 或 10; 叶柄纤细, 长 12—18 厘米, 无毛; 托叶和叶柄基部合生成鞘状, 宿存或与叶柄一起脱落; 小叶片革质, 倒卵状长圆形或长圆形, 长 6—10 厘米, 宽 1.5—3.5 厘米, 先端急尖或钝形, 稀短渐尖, 基部渐狭或钝形, 上面深绿色, 有光泽, 下面灰绿色, 两面均无毛, 边缘全缘, 中脉仅在下面隆起, 侧脉 4—6 对, 和稠密的网脉在两面微隆起; 小叶柄有狭沟, 长 1.5—3 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 长 20 厘米以下, 主轴和分枝幼时密生星状绒毛, 后毛渐脱净; 伞形花序十几个至几十个总状排列在分枝上, 有花 3—10 朵; 苞片阔卵形, 长 0.5—1.5 厘米, 外面密生星状绒毛, 早落; 总花梗长不及 5 毫米, 花梗长 1.5—2.5 毫米, 均疏生星状绒毛; 花白色, 长约 3 毫米; 萼长约 1 毫米, 边缘全缘, 无毛; 花瓣 5—6, 有 3 脉, 无毛; 雄蕊和花瓣同数而等长; 子房 5—6 室; 无花柱, 柱头

5—6;花盘略隆起。果实卵形,有5稜,连花盘长4—5毫米,直径4毫米;花盘五角形,长约为果实的1/3—1/4。花期7月,果期8月。

产台湾、广西(防城)及广东(海南岛保亭、崖县、澄迈)。生于谷地密林下或溪边较湿润处,常附生于树上,海拔在海南岛为400—900米。模式标本采自台湾。

本种为民间常用草药,一般外用,止痛效果良好。

早田文藏(B. Hayata)发表本新种时,将 *Schefflera arboricola* 同时作为异名发表。在其图版4又用另一个学名 *Heptapleurum sasakii* Hay. 发表,因此,这个学名应作为异名处理。

14. 福建鹅掌柴

Schefflera fukienensis Merr. 中山大学农林植物所专刊 3: 255. 1937; Li in *Sargentia* 2: 34. 1942.

藤状灌木;小枝圆柱状,无毛。叶有小叶3—4;叶柄长10—12厘米,无毛;小叶片薄革质,椭圆形,长5—9厘米,宽3.5—6厘米,先端急尖或短渐尖,基部阔楔形至近圆形,两面均无毛,边缘全缘或近先端有钝齿1—2个,侧脉纤细,约5对,和疏散的网脉在两面均明显;小叶柄不等长,中央的长4.5厘米,两侧的长1—1.2厘米,无毛。圆锥花序顶生,疏散,长约12厘米;分枝少,只有3—4枝,在下部的长达10厘米;伞形花序直径7—8毫米,总状排列在分枝上,各有花6—10朵;总花梗长6—15毫米;花梗长约2毫米;花小,5数;萼陀螺形,边缘全缘或有微齿,无毛;花瓣三角状卵形,长1.6毫米,先端急尖;雄蕊比花瓣稍长;子房5室,稀6室。

产福建,少见。

本种原记载叶只有3小叶,但保藏于厦门大学生物系植物标本室的同号模式标本钟心煊6159号标本(李惠林在 *Sargentia* 2: 34. 1942 误为6157号),除了3小叶外,还有一个叶有4小叶,故叶应有小叶3—4。从小叶片形态看,很像密脉鹅掌柴 *Schefflera venulosa* (Wight & Arn.) Harms, 因为后者也偶有4小叶的叶,可能是同一种植物,有待进一步研究。

15. 扁盘鹅掌柴

Schefflera khasiana (C. B. Clarke) Vig. in Ann. Sci. Nat. 9. Bot. 9: 351. 1909; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 691. 1933; Li in *Sargentia* 2: 35. 1942——*Heptapleurum khasianum* C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 730. 1879.

乔木;小枝棕色,被多少很快脱落的绒毛。叶有7小叶;叶柄长约18厘米,无毛;小叶片革质,长圆形,长12—18厘米,宽5—6厘米,先端渐尖,基部圆形,两面均无