

全缘或近先端处疏生细齿 1—3 个,基脉三出,侧脉 6—8 对,纤细,弧拱而连结,两面均明显,网脉不明显;叶柄长 4—15 毫米或稍长,无毛。伞形花序顶生,单生或 2—3 个聚生,侧生的花序较小,中央的较大,有花 6—15 朵;总花梗长 4—8 毫米;花梗长 3—5 毫米;萼长 1 毫米,边缘全缘或有不明显的小齿;花瓣阔三角形,长 1.5 毫米;子房 2 室,稀 3 室;花柱长约 1 毫米,顶端浅裂。果实球形,平滑,直径约 5 毫米;宿存花柱长 1.5 毫米,离生,反曲;果梗长 8—10 毫米。 花期 9 月,果期 11 月。

产广东(云浮、信宜)、广西(容县)。生于溪边湿地,海拔在广东为 750 米。模式标本采自广东信宜。

本种最主要的特点为子房 2 室,花柱 2,在结实时离生,反曲。

10. **两广树参** 拟小花木五加(植物分类学报),假小花木五加(广西植物名录)

Dendropanax parvifloroides C. N. Ho, 植物分类学报 2: 73. Pl. 5. 1952.

直立灌木,高约 2 米,无毛。叶片膜质至薄纸质,密生半透明红色腺点,倒卵状长圆形、长圆形或披针形,长 7—14 厘米,宽 2—6 厘米,先端突然渐尖至渐尖,基部楔形或钝形,两面均无毛,边缘全缘或近先端处有细齿 2—4 个,基脉三出,明显或不明显,中脉隆起,侧脉 6—8 对,与中脉几成直角,两面均明显,网脉下面比上面明显;叶柄长 1—3.5 厘米,无毛。伞形花序顶生,单生或 2—4 个聚生,有花 15—100 朵;总花梗长 5—15 毫米;花梗细长,长约 1 厘米;萼长 2 毫米,边缘有 5 小齿;花瓣 5,阔三角形,长约 2 毫米;雄蕊 5,花丝长约 1.5 毫米;子房 2 室,稀 3 室;花柱合生成柱状,长约 0.6 毫米。果实近球形,直径 6 毫米;宿存花柱长约 1 毫米,顶端 2—3 浅裂。 花期 9 月,果期 11 月。

产广西(龙州)、广东(信宜、阳春)、云南(富宁)。生于常绿阔叶林下较荫蔽处。模式标本采自广西龙州大青山。

本种叶形、子房室数目与双室树参 *Dendropanax bilocularis* C. N. Ho 极相近,但伞形花序花数较多,花柱在结实时仅顶端浅裂。

11. **广西树参** 广西木五加(广西植物名录)

Dendropanax kwangsiensis Li in Sargentia 2: 45. 1942.

灌木,高约 2—3 米。叶片薄纸质,有半透明黄色腺点,无毛,卵状椭圆形,长 4.5—12 厘米,宽 1.5—5 厘米,先端渐尖,基部楔形,基脉三出,侧脉 8—10 对,两面近明显,网脉不明显;叶柄长 0.5—2.5 厘米。花未见。伞形果序顶生,单生或 2—3 个聚生,有果实约 20 个;果序梗长 0.5—1 厘米;果梗长 1—1.5 厘米。果实球形,直径 5—6 毫米;花柱合生成柱状,长 1—1.5 毫米,顶端 2—3 裂,宿存。种子 5 或 1—3 个,其