

余不育。

产广西(十万大山)。未见到标本,根据原记载描述。

李惠林在原记载说本种的花柱顶端 2—3 裂,又说种子 5 个或 1—3 个,其余不育。根据花柱分裂数目推测,其子房应为 2—3 室,所以“种子 5 个”的记载显然是错误的。

本种叶片薄纸质,有腺点,子房 2—3 室,花柱顶端 2—3 浅裂等特征与两广树参 *Dendropanax parvifloroides* C. N. Ho 极相似,可能是同一种植物。由于未见到标本以及原记载过于简单,需待进一步研究后,方能确定。

组 2. 合柱树参组——Sect. *Columnistylus* Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 142. 1965.

本组我国有下列 5 种。

12. 短柱树参 短柱杞李蓇(福建师范学院学报)

Dendropanax brevistylus Ling, 植物分类学报 1: 213. 1951; 林来官, 福建师范学院学报第一期下卷 149. 1959.

直立灌木,高约 1 米;小枝淡绿色,无毛。叶片纸质或厚纸质,密生半透明红棕色腺点,不分裂叶片长圆形、披针状长圆形或卵状披针形,长 6—16 厘米,有时长至 25 厘米,宽 3—6 厘米,先端短渐尖或急尖,基部钝形或圆形,分裂叶片掌状 3 深裂,两面均无毛,边缘在中部以上疏生细齿,基脉三出,侧脉 8—12 对,在远离叶缘处连结,两面均明显,微隆起,网脉稍明显;叶柄长 1—1.5 厘米,或长至 3 厘米以上,无毛。伞形花序顶生,单生或 2—5 个聚生,有花 30—80 朵;总花梗长 1.2—2 厘米;小苞片微小;花梗长 5—10 毫米;萼长 1—1.5 毫米,边缘有 5 小齿;花瓣 5,淡黄绿色,长 2—2.5 毫米;雄蕊 5,花丝长约 2 毫米;子房 5 室;花柱合生成短柱状,长 0.6—0.8 毫米。果实球形,直径 7—8 毫米,宿存花柱长 1—1.5 毫米。花期 8 月,果期 10—12 月。

产福建(福州、永安、仙游、南靖)、江西(南坪)。生于常绿阔叶林下,海拔 200—1000 米。模式标本采自福建德化。

本种叶形与保亭树参 *Dendropanax oligodontus* Merr. & Chun 极相似,但子房 5 室,花柱全部合生,可以区别。

13. 细梗树参 细梗木五加(广西植物名录)

Dendropanax gracilis Tseng & Hoo, 植物分类学报增刊 1: 144. 1965 ——
Dendropanax angustilobus auct. non (Hu) Merr.: Li in Sargentia 2: 43. 1942, pro