

色星状绒毛;苞片和小苞片长圆状卵形,密生白色星状绒毛,前者长2毫米,后者长1毫米;花梗长3—4毫米,密生白色星状绒毛;萼长2.5毫米,密生白色星状绒毛,边缘有5个三角形钝齿;花瓣5,披针形,上半部淡绿色,下半部紫红色(据采集记录),长约3毫米;子房4室或3室,花柱合生成柱状。果实(未熟)长圆状球形,长约3.5毫米,无稜,宿存花柱长2毫米。 花期12月。

产广西(凌云)和贵州(印江)。生于疏林或干燥山谷中,海拔400—1300米。模式标本采自广西凌云。

本种和细梗罗伞 *Brassaiopsis gracilis* Hand.-Mazz. 相近,但后者小叶片膜质,上面疏生短刺毛,下面绿色,基部狭尖,边缘有锯齿,无小叶柄或只有短柄,花序主轴被锈色绒毛,子房2室等点不同。又和尖叶罗伞 *Brassaiopsis acuminata* Li 相近,但后者小叶片下面、小叶柄、叶柄和花序主轴都被锈色绒毛,小叶片下面非灰白色,花梗长达1.5厘米,子房2室,果实扁球形等点不同。

4. 镇康罗伞

Brassaiopsis chengkangensis Hu, 静生汇报 10: 162. 1940; Li in *Sargentia* 2: 56. 1942.

乔木,高达15米,胸高直径20厘米,树皮灰淡绿色。叶有小叶5—7,稀3;叶柄粗壮,长30—60厘米,幼时密生锈色粗刺毛,后毛渐脱落;小叶片革质,卵状长圆形至长圆状披针形,长15—30厘米,有时长达50厘米,宽6—13厘米,有时宽达28厘米,先端渐尖至长渐尖,基部阔楔形至圆形,两面幼时密生锈色星状绒毛和粗刺毛,后毛渐脱落,上面几无毛,下面毛稀疏,边缘疏生有小尖头的齿,侧脉18对,两面均明显,网脉明显;小叶柄长1.5—4.5厘米,有时长至10—15厘米,粗壮,密生锈色粗刺毛。圆锥花序大,长35厘米,有时长达90厘米,下垂;主轴粗壮,密生锈色粗刺毛;伞形花序直径3.5—5厘米,有花多数;总花梗长2.5—5厘米,花梗长8毫米,均密生粗刺毛;苞片三角状卵形,先端尖,长约1.5厘米,和舌状的小苞片均密生锈色粗刺毛;萼长2.5毫米,密生粗刺毛,边缘有5个线状披针形的齿;花瓣5,卵形,长3毫米,外面密生锈色粗刺毛;雄蕊5,长2毫米;子房2室,稀3—4室,花盘厚;花柱合生成柱状,长约1.2毫米。 8月现蕾,次年4月开花。

产云南(镇康、凤庆、潞西)。生于林中,海拔1700—2400米。模式标本采自云南镇康。

本种主要特点为小叶片很大,两面幼时密生粗刺毛及星状绒毛。

5. 瑞丽罗伞